

سلسلة **المُرشِد**

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني
للقسم العلمي

الصف

1

الثانوي
الأزهري

إعداد: أ / مجدي عبد العليم



الباب الثالث

توارث الصفات

الفصل الأول : الكروموسومات والمعلومات الوراثية

في بداية القرن العشرين اكتشف العلماء أن:

- المعلومات الوراثية التي تؤدي إلى ظهور الصفات الوراثية بجميع الكائنات الحية تحمل على الكروموسومات (الصبغيات).
- الكروموسومات توجد داخل نواة كل خلية من خلايا جميع الكائنات الحية.
- يوجد نوعين من الخلايا في جميع أقسام الكائنات الحية:
 - ١- خلايا جسدية، تنتج من الانقسام الميوزي لخلايا جسدية مثل: خلايا الجلد، العضلات، الدم
 - ٢- خلايا جنسية (أمشاج)، تنتج من الانقسام الميوزي لخلايا المناسل وتضم:
 - أمشاج مذكرة (حبوب لقاح في النبات، حيوانات منوية في الحيوان والإنسان).
 - أمشاج مؤنثة (بويضات في النبات والحيوان والإنسان).

الطرز الكروموسومي

هو ترتيب الكروموسومات تنازلياً حسب حجمها ثم ترقيمها:

- يمكننا تصنيف الكروموسومات عندما تكون في اوضح صوره لها.
- تصنف الكروموسومات في ازواج متماثلة (في الخلايا الجسدية والمناسل) وترتب حسب حجمها تنازلياً ثم يتم ترقيمها ويعرف ذلك بالطرز الكروموسومي.
- لتسهيل ترتيب وترقيم الكروموسومات يمكن تلوينها بألوان مختلفة.


الطرز الكروموسومي في الإنسان

- يوجد في الخلايا الجسديه للإنسان ٤٦ كروموسوم (٢٣ زوج).
- ترتب هذه الكروموسومات في ازواج متماثلة تنازلياً حسب حجمها من رقم (١): (٢٣) حيث:
 - تسمي الازواج من (١): (٢٢) بالكروموسومات الجسدية.
 - يسمي الزوج رقم (٢٣) بالكروموسومات الجنسية لأنه يحمل المعلومات الوراثية الخاصة بتحديد الجنس (ذكر أم أنثى).

الفصل الدراسي الثاني

تتميز الكروموسومات الجنسية بأنها:

- ١- لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم، فهو يلي زوج الكروموسومات (٧) في الحجم ولكنه يرتب في نهاية الكروموسومات ويحمل رقم (٢٣).
- ٢- غير متماثل في الذكر (XY) ومتماثل في الأنثى (XX)،
لذلك يختلف الطرز الكروموسومي للأنثى عن الطرز الكروموسومي للذكر.



الطرز الكروموسومي لأنثى الإنسان



الطرز الكروموسومي لذكر الإنسان

أعداد الكروموسومات

- يختلف عدد الكروموسومات في الكائنات الحية من نوع لآخر إلا أنه ثابت في أفراد النوع الواحد.
- ثبات أعداد الكروموسومات لأفراد النوع الواحد دليل على أن الكروموسومات هي التي تحمل المعلومات الوراثية التي تحدد صفات الكائن الحي.

الجدول التالي يوضح أعداد الكروموسومات في الخلايا الجسدية لبعض الكائنات الحية:

النوع	عدد الصبغيات في الخلية الجسدية	النوع	عدد الصبغيات في الخلية الجسدية
الإنسان	٤٦ (٢٣ زوج)	الفوريلا	٤٨ (٢٤ زوج)
الدجاجة	٣٢ (١٦ زوج)	القمح	٤٢ (٢١ زوج)
الهرة (القطعة)	٣٨ (١٩ زوج)	البصل	١٦ (٨ أزواج)
الدروسوفيلا (ذبابة الفاكهة)	٨ (٤ أزواج)	البطاطا	٤٨ (٢٤ زوج)
الكلب	٧٨ (٣٩ زوج)	البازلاء	١٤ (٧ أزواج)
الضفدعة	٢٦ (١٣ زوج)	التبغ	٤٨ (٢٤ زوج)

أعداد الكروموسومات في الخلايا الجسدية والخلايا الجنسية للكائنات الحية:

الخلايا الجسدية	الخلايا الجنسية (الأمشاج)
- تحتوي على مجموعتين من الكروموسومات المتماثلة (أحدهما موروث من الأب والآخر موروث من الأم، أي أنها ثنائية المجموعة الصبغية (2n)). مثال: تحتوي نواة الخلية الجسدية في الإنسان على ٤٦ كروموسوم (٢٣ زوج).	- تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة بالخلايا الجسدية لأنها تنتج من الانقسام الميوزي لخلايا المناسل، أي أنها أحادية المجموعة الصبغية (n). مثال: تحتوي نواة المشيج المذكر (الحيوان المنوي) والمشيج المؤنث (البويضة) في الإنسان على ٢٣ كروموسوم.

المارش في الأحياء اث

الكروموسومات والجينات

الجين: هو تتابع من النيوكليوتيدات على جزء DNA يمثل شفرة لبروتين ما مسئول عن ظهور صفة معينة.

- الكروموسومات تتكون من الحمض النووي DNA والبروتين.
- DNA يتكون من وحدات بنائية تسمى نيوكليوتيدات.
- يحمل جزء DNA الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية للكائن الحي.

النظرية الكروموسومية

وضع ساتون وبوفري عام ١٩٠٢ أسس النظرية الكروموسومية والتي يمكن بلورتها كالتالي:
أسس النظرية الكروموسومية:

- ١- توجد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل أزواج متماثلة ($2n$).
- ٢- تحتوي الخلايا الجنسية (الأمشاج) على نصف عدد الكروموسومات ($2n$) نتيجة الانقسام الميوزي (الاختزالي) حيث تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة إلى مجموعتين متساويتين من الكروموسومات تتوزع على الأمشاج.
- ٣- يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوكا مستقلا عند انتقاله في الأمشاج.
- ٤- عند الإخصاب (اندماج الماشيج الذكري مع الماشيج الأنثوي) يعود العدد الزوجي للكروموسومات من جديد.
- ٥- تقع الجينات على الكروموسومات والكروموسوم الواحد قد يحمل مئات من الجينات.

تفسير قوانين مندل في ضوء نظرية الكروموسومات:

توصل جريجور مندل عام ١٨٦٠ بعد إجراء تجاربه على نبات بازلاء الخضر إلى الآتي:

- ١- كل صفة وراثية يتحكم فيها زوجا واحدا من العوامل الوراثية (التي عرفت فيها بعد باسم الجينات) قد تكون سائدة أو متنحية.
- ٢- كل زوج من الصفات المتقابلة يطلق عليه اسم الصفات الأليلومورفية (الصفات المتبادلة).

قانون انعزال العوامل الوراثية (القانون الأول لماندل):

عند تهجين فردين نقيين أحدهما يحمل الصفة السائدة والآخر يحمل الصفة المتنحية تظهر: الصفة السائدة بنسبة ١٠٠% في الجيل الأول.
- الصفتان السائدة والمتنحية بنسبة ٣:١ الجيل الثاني ويطلق على هذه الصفات المندلية وهي صفات تامة السيادة.

قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية (القانون الثاني لماندل):

عند تهجين فردين نقيين مختلفين في زوجين أو أكثر من الصفات الأليلومورفية تورث صفتا كل زوج منهما مستقلة، وتظهر: الصفتين السائدتين بنسبة ١٠٠% في أفراد الجيل الأول.
- الصفتين السائدتين والمتنحيتين بنسبة ١:٣:٣:٩ في أفراد الجيل الثاني.

في ضوء النظرية الكروموسومية أوضح العلماء قوانين مندل كالتالي:

- ١- في الانقسام الميوزي تنعزل الجينات المحمولة على أزواج الكروموسومات إلى الأمشاج وعند الإخصاب تعود الكروموسومات أزواجا من جديد.
- ٢- توزيع الجينات المحمولة على الكروموسومات في الأمشاج يكون توزيعا حرا لأن كل جين يقع على كروموسوم مستقل.

الفصل الدراسي الثاني


رموز خاصة بالتزاوج الوراثي:

- علامة التزاوج x.
- علامة الذكر.
- الجيل الأول: P₁.
- الأمشاج G₁.
- الجيل الثاني: P₂.
- الأمشاج G₂.
- علامة الأنثى.
- أفراد الجيل الأول F₁.
- أفراد الجيل الثاني F₂.

تطبيقات على القانون الأول

١ قانون انعزال العوامل الوراثية في ضوء النظرية الكروموسومية (صفة لون الأزهار) إذا علمت أن جين اللون القرمزي R سائد على جين اللون الأبيض r.


يمكن التعبير عن تهجين نبات بازلاء قرمزي الأزهار (نقي) مع نبات أبيض وراثياً كالتالي:



٢ تم تهجين نبات بازلاء قرمزي الأزهار (RR) مع نبات بازلاء أبيض الأزهار (rr).

وضح على أسس وراثية التركيب الوراثي لأفراد الجيل الأول والجيل الثاني في ضوء النظرية الكروموسومية.


أجب بنفسك.



٣ إذا علمت أن جين العيون المتسعة سائد على جين العيون الضيقة، فما هي احتمالات ظهور صفة العيون من تزاوج رجل من امرأة كل منهما متسع العينين هجين. وضح ذلك على أسس وراثية في ضوء النظرية الكروموسومية.

٤

إذا علمت أن جين الطول في نبات البازلاء سائد على جين القصر، فما هي احتمالات توارث هذه الصفة عند تهجين نبات بازلاء طويل الساق نقى مع آخر قصير الساق.
وضح ذلك على أسس وراثية في ضوء النظرية الكروموسومية.




تطبيقات على القانون الثاني

١

قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية في ضوء النظرية الكروموسومية (صفتي لون وشكل البذرة) إذا علمت أن:

- جين اللون الأصفر للبذر Y سائد على جين اللون الأخضر y .
- جين الشكل أملس للبذور S سائد على جين الشكل المجعد s .

يمكن التعبير عن تهجين نبات بازلاء أصفر أملس البذور مع نبات أخضر مجعد البذور وراثياً كالتالي:



٢


عند تهجين نبات بازلاء بذوره صفراء ملساء مع نبات آخر بذوره خضراء مجعدة كانت الأفراد الناتجة جميعها ذات بذور صفراء وملتساء ..
فسر ذلك على أسس وراثية في ضوء النظرية الكروموسومية.

الفصل الدراسي الثاني

Parent 1: YYSS
 Parent 2: yyss
 Gametes: YS, Ys, yS, ys
 Offspring: YYSS, YySs, YySs, YySs, yyss

فسر ذلك على أسس وراثية في ضوء النظرية الكروموسومية.

Hand-drawn genetic cross diagram for a dihybrid cross. At the top, two parent genotypes are shown: $MMrr \times mmRr$. Below them, four types of gametes are listed: MR , Mr , mR , and mr . A Punnett square follows, with gametes on the left and top. The cells contain the following genotypes: $MMRr$, $MMrr$, $MmRr$, $Mmrr$ (top row) and $MmRr$, $Mmrr$, $mmRr$, $mmrr$ (bottom row). Below the Punnett square, the phenotypes are listed in Arabic: 'جلود' (skin) for the first column (MM) and 'التركيب المظهرية' (phenotype) for the second column (Rr). The phenotypes are: 'جلود ممتلئة' (full skin) for $MMRr$, 'جلود متقلبة' (wrinkled skin) for $MMrr$, 'جلود ممتلئة' (full skin) for $MmRr$, 'جلود متقلبة' (wrinkled skin) for $Mmrr$, 'جلود ممتلئة' (full skin) for $mmRr$, 'جلود متقلبة' (wrinkled skin) for $mmrr$. At the bottom, the counts are given: 1 for full skin (MM), 2 for wrinkled skin (mm), 1 for full skin (MM), and 2 for wrinkled skin (mm).



الفصل الثاني : تداخل فعل الجينات

الصفات المندلية هي صفات تامة السيادة، أى أن جين الصفة السائدة يسود على جين الصفة المتنحية ويحجب أثره تماماً، مثل لون الزهرة ولون وشكل البذور في نبات بازلاء الخضر. لكن باستمرار الملاحظة وإجراء التجارب على نباتات وحيوانات أخرى تبين أن بعض صفاتها لا يورث وفقاً لقانوني مندل وأطلق عليهما الصفات اللامندلية ومنها حالات يتأثر ظهور الصفات الوراثية فيها بتداخل فعل الجينات.

تداخل فعل الجينات (الصفات اللامندلية)

- ١- إنعدام السيادة.
- ٢- الجينات المتكاملة.
- ٣- الجينات المميطة.

أولاً : إنعدام السيادة

حالة وراثية يحكم وراثة الصفة فيها زوج من الجينات، لا يسود أحدهما على الآخر بل يتداخلان معا في إظهار صفة جديدة.

- تكون النسبة في: - الجيل الأول ١٠٠% صفة جديدة.

- الجيل الثاني ١ : ٢ : ١

(صفة أحد الأبوين) (صفة جديدة) (صفة الفرد الأبوي الآخر)

من أمثلة انعدام السيادة:

- توارث صفة لون الأزهار في نبات شب الليل.



- توارث الفصيلة AB في الإنسان.

(أ) توارث صفة لون الأزهار في نبات شب الليل

— عند تهجين نبات أزهاره حمراء (RR) مع نبات أزهاره بيضاء (WW) ينشأ الجيل الأول من النباتات أزهاره قرنفلية (RW) أى صفة جديدة حيث لا يسود جين اللون الأحمر للأزهار على جين اللون الأبيض نتيجة تداخل فعل الجينات حيث يكون لكل جين من الجينين المتقابلين أثر في إظهار الصفة الجديدة.



— عند ترك نباتات الجيل الأول تلقح نفسها ذاتياً وزرع بذورها، ينشأ الجيل الثاني من النباتات ذات أزهار بيضاء وأزهار قرنفلية وأزهار حمراء وذلك بنسبة ١ : ٢ : ١ على الترتيب.

يمكن التعبير عن ذلك بالرموز كالتالي:



الفصل الدراسي الثاني

مثال: في إحدى سلالات الدجاج الأندلسي حدث تلقيح بين ديك أسود الريش (BB) ودجاجة بيضاء الريش (WW) فنتج جيلا كله أزرق الريش وعند ترك ديوك الجيل الأول تلقح دجاجات نفس الجيل، نشأ الجيل الثاني تجمع أفراده بين صفة الريش الأبيض والأزرق والأسود، فسر ذلك على أسس وراثية.



يتضح مما سبق أنه في حالة انعدام السيادة:

- توجد ثلاث طرز مظهرية تقابل الثلاث طرز الجينية للأفراد.
- لكل طرز مظهري طرز جيني واحد فقط.
- تحورت النسبة المندلية من ٣:١ (في حالة السيادة التامة) إلى ١:٢:١ (في حالة إنعدام السيادة).


تطبيقات على انعدام السيادة

١ عند تهجين نباتين من نباتات شب الليل أحدهما أزهاره حمراء اللون والآخر أزهاره بيضاء اللون نتج في الجيل الأول أزهار قرنفلية اللون وعندما لقحت الأخيرة ذاتيا أعطت نباتات ذات أزهار حمراء وقرنفلية وبيضاء بنسبة ١:٢:١ على الترتيب. فسر ذلك على أسس وراثية.

أجب بنفسك

٢ عند تزاوج نوع من الطيور أسود اللون (BB) مع آخر أبيض اللون (WW) ظهرت أفراد الجيل الأول كلها رمادية اللون. فسر ذلك على أسس وراثية.

أجب بنفسك



٣ فسر على أسس وراثية:

تهجين نبات شب الليل يحمل أزهارا حمراء مع نبات يحمل أزهاراً قرنفلية.

٤ في إحدى سلالات الدجاج الأندلسي- حدث تلقيح

بين ديك أسود الريش ودجاجة بيضاء الريش فنتج جيلا كله أزرق الريش.

(أ) ما الطرز الجينية والمظهرية الناتجة من تزاوج ديك ودجاجة من أفراد الجيل الأول ؟

(ب) بم تفسر اختلاف قانون مندل عن ناتج هذا التلقيح من الناحية الوراثية ؟



أجب بنفسك

المارش في الأحياء اث

٥ في إحدى سلالات عصافير الزينة إذا كان لديك عصفوران أحدهما أصفر الريش والآخر أحمر الريش وكان ناتج تزاوجهما عصافير برتقالية الريش.

(أ) فما ناتج التزاوج بين أفراد الجيل الأول ؟

(ب) إذا علمت أن العصافير برتقالية الريش تدر عائدا ماديا أعلي عند بيعها، فكيف تستطيع تحقيق أعلي عائدا مادي ؟



(ب) بتزاوج عصفوران أحدهما أصفر الريش مع آخر أحمر الريش فيكون النسل الناتج ١٠٠٪ برتقالي الريش.

مقارنة بين السيادة التامة وانعدام السيادة:

انعدام السيادة	السيادة التامة	
لا تسود إحدى الصفتين على الأخرى بل كل منهما يحدث أثرة.	تسود جينات إحدى الصفتين على جينات الصفة الأخرى.	سيادة إحدى الصفتين
تظهر في جميعهم صفة جديدة بنسبة ١٠٠٪	تظهر في جميعهم الصفة السائدة بنسبة ١٠٠٪	نسبة أفراد الجيل الأول
يتكون من ٣ مجموعات من الأفراد: - الأولى تحمل صفة أحد الأبوين. - الثانية تحمل صفة جديدة. - الثالثة تحمل صفة الفرد الأبوي الآخر وذلك بنسبة ١:٢:١ على الترتيب.	يتكون من مجموعتين من الأفراد: - أحدهما تظهر بها الصفة السائدة. - الأخرى تظهر بها الصفة المتنحية وذلك بنسبة ٣:١ على الترتيب.	نسبة أفراد الجيل الثاني
يدل الطرز المظهري على الطرز الجيني.	لا يدل الطرز المظهري على الطرز الجيني في حالة الصفة السائدة ويدل عليه في حالة الصفة المتنحية.	الطرز المظهري
لون الأزهار في نبات شب الليل.	لون الأزهار في نبات بازلاء الخضر.	مثال

الفصل الدراسي الثاني

(ب) توارث فصائل الدم في الإنسان

أهمية دراسة فصائل الدم:

- ١- فض المنازعات في تحديد نسب الأطفال لأبائهم الحقيقيين (إذ تفيد في نفي الأبوة وليس إثباتها).
- ٢- تجنب مخاطر عمليات نقل الدم بين الأفراد حيث تتوقف عمليات نقل الدم على نوع فصيلة الدم ونوع عامل الريسوس.
- ٣- تفيد في دراسات تصنيف السلالات البشرية ودراسة التطبيق.

تقسيم فصائل الدم

١- التقسيم الوراثي لفصائل الدم:

- يمكن العلماء من تصنيف فصائل الدم إلى أربعة فصائل هي (A,B,AB,O).
- يتحكم في وراثة فصائل الدم ثلاثة أنواع من الجينات تسمى بدائل (الآليلات) يرث الفرد منه زوج واحد فقط يوجد على زوج الكروموسوم التاسع لدى جميع البشر ويرمز لهذه الجينات بالرموز (A,B,O).
- يتكون من هذه البدائل ستة طرز جينية هي (AA,BB,AB,AO,BO,OO).
- يوجد لهذه الطرز الجينية أربعة طرز مظهرية فقط (A,B,AB,O) لأن البديل (O) متنحى بالنسبة لكل من (A,B).
- تنعدم السيادة بين البديلين (A,B) في الطرز (AB).
- يمكن تحديد الطرز الجينية من متابعة الطرز المظهرية للأبوين والأبناء.
- **استنتاج:** تمثل وراثة فصائل الدم حالة تعدد بدائل وسيادة وانعدام سيادة:
- **تعدد بدائل:** حيث توجد ثلاث بدائل للجين (A,B,O) نصيب الفرد منها اثنان فقط.
- **سيادة تامة:** حيث يسود كل من الجينين (A,B) على الجين (O).
- **انعدام سيادة:** حيث لا يسود كل من الجين (B) والجين (A) على الآخر بل يشتركان معا في إظهار فصيلة جديدة هي (AB).

٢- التقسيم العلمي (الكيميائي) لفصائل الدم:

- تقسيم فصائل الدم إلى أربعة فصائل (A,B,AB,O) حسب نوعين من المواد الكيميائية التي توجد في الدم، وهي:


- مولدات الالتصاق: توجد على سطح خلايا الدم الحمراء، وهي نوعان: - مولدات a. - مولدات b.
- الأجسام المضادة: مواد مضادة للمولدات توجد في بلازما الدم، وهي:
- مضادات anti- a ومضادات anti- b.

الجدول التالي يوضح التقسيم الكيميائي لفصائل الدم:

الأجسام المضادة	مولدات الالتصاق	الفصيلة
anti- b	A	A
Anti- a	B	B
—	A,b	AB
anti- a anti- b	—	O

عمليات نقل الدم

يتم نقل الدم بين الفصائل المختلفة وفق نظام محدد بسبب وجود مولدات الالتصاق والأجسام المضادة. الجدول والشكل التاليان يوضحان نظام نقل الدم بين الفصائل المختلفة:



المتبرع (المُعْطَى)					المتلقي (المُسْتَقْبَل)
A	B	AB	O		
✓	×	×	✓	A	
×	✓	×	✓	B	
✓	✓	✓	✓	AB	
×	×	×	✓	O	

المقارنة بين فصائل الدم كالتالي:

الفصيلة (O)	الفصيلة (AB)	الفصيلة (B)	الفصيلة (A)	
OO	AB	BB- BO	AA- AO	التركيب الجيني
لا تحتوي على مولدات التصاق	a, b	b	a	مولدات الالتصاق التي توجد بها
Anti- a - Anti- b	لا تحتوي على أجسام مضادة	Anti- a	Anti- b	الأجسام المضادة التي توجد بها
تعطى جميع الفصائل (معطى عام)	AB	B, AB	A, AB	الفصيلة التي تعطى لها
O	تستقبل من جميع الفصائل (مستقبل عام)	B, O	A, O	الفصيلة التي تستقبل منها
لا تتخثر عند إضافة anti- a أو anti- b.	تتخثر عند إضافة anti- a أو Anti- b إليها.	تتخثر عند إضافة anti- b إليها.	تتخثر عند إضافة anti- a إليها.	كيفية تحديدها

تحديد نوع فصائل الدم

- لكل فصيلة من فصائل الدم مولدات التصاق تقابلها أجسام مضادة تتفاعل معها، فمثلاً: مولدات الالتصاق (a) يتفاعل معها الأجسام المضادة (anti- a).
- يتم تحديد نوع فصيلة الدم من خلال التفاعلات التي تحدث بين مولدات الالتصاق والأجسام المضادة وحدوث تخثر للدم.
- لذا لتعيين فصيلة الدم يلزم وجود كلا من نوعي الأجسام المضادة anti- a، anti- b.

الفصل الدراسي الثاني

خطوات تحديد نوع فصيلة الدم:

(١) نضع قطرتين من دم الشخص المراد تحديده فصيلته على طرفي شريحة زجاجية.

(٢) نضع anti- a على قطرة الدم الأولى anti- b على قطرة الدم الثانية.

(۳) نقیب کل منهما علی حدہ.

النتيجة: نلاحظ حدوث تخثر (تجمع) للدم أو عدم حدوث تخثر، كما يتضح من الجدول والشكل التاليان:

إضافة anti-b مزرعة زجاجية اختبر	إضافة anti-a اختبر	قطرة الدم الأولى anti- a +	قطرة الدم الثانية anti- b +	الفصيلة المحتملة
الفصيلة A (-)	(+)	حدوث تخثر (+)	عدم حدوث تخثر (-)	A
الفصيلة B (+)	(-)	عدم حدوث تخثر (-)	حدوث تخثر (+)	B
الفصيلة AB (+)	(+)	حدوث تخثر (+)	حدوث تخثر (+)	AB
الفصيلة O (-)	(-)	عدم حدوث تخثر (-)	عدم حدوث تخثر (-)	O

١- يطلق على فصيلة الدم (O) معطى عام لأنها تعطى الدم لجميع الفصائل لخلوها من نوعى مولدات الالتصاق (a-b).

٢- يطلق على فصيلة الدم (AB) مستقبل عام لأنها تستقبل الدم من جميع الفصائل لخلوها من نوعى الأجسام المضادة (anti- a, anti- b).

مخاطر نقل الدم:

١- عندما ينقل لشخص دم غير مناسب لنوع فصيلته تظهر عليه أعراض، مثل:

- رعشة الجسم. - صداع. - آلام الصدر. - ضيق التنفس. - زرقة الجسم. - عدم انتظام دقات القلب. - انخفاض ضغط الدم وتنتهي غالباً هذه الأعراض بالوفاة.

٢- يمكن انتقال عدوى فيروسية إلى الشخص المستقبل، مثل:


- فيروس الالتهاب الكبدي B. - فيروس الإيدز AIDS.

لذلك يجب قبل نقل الدم إجراء فحوصات على دم الميعطى للتأكد من:

- مناسبته لدم المستقبل.

- خلوه من الكائنات المسببة للأمراض مثل الفيروس.

تطبيقات على فصائل الدم




تزوج رجل فصيلة دمه (AB) من امرأة فصيلة دمها (O).

ما فصائل الدم المتوقعة ؟ فسر ذلك على أسس وراثية.


المُرشد في الأحياء اث

٢ اختلط طفلين حديثي الولادة، في إحدى المستشفيات وكان كل منهما ينتمي لإحدى العائلتين التاليتين:
 العائلة الأولى: فصيلة دم الأبوين (AB,A) وفصيلة دم الطفل (O).
 العائلة الثانية: فصيلة دم الأبوين (B,O) وفصيلة دم الطفل (B).
 كيف يمكننا نسب كل من الطفلين إلى عائلته من خلال دراستنا لقواعد وراثية فصائل الدم؟



سما سبق نستنتج أن:

- العائلة الأولى لا يمكن أن تنجب طفل من الفصيلة (O).
 - العائلة الثانية يمكنها أن تنجب طفل من الفصيلة (O) أو طفل من الفصيلة (B).
- ومن خلال معرفتنا أن كل عائلة أنجبت طفل واحد فقط يكون الطفل ذو فصيلة الدم (O) أبناً للعائلة الثانية والطفل ذو فصيلة الدم (B) أبناً للعائلة الأولى.



٣ فسر على أسس وراثية:

تزوج رجل فصيلة دمه (A) من امرأة فصيلة دمها (B) فأنجبا طفلاً فصيلة دمه (O).


- الاحتمال الأول: BO × AO
- الاحتمال الثاني: BO × AA
- الاحتمال الثالث: BO × AB

٤ أم فصيلة دمها (AB) ولها ابن من نفس الفصيلة.


ما الطرز الجينية المحتملة للأب بدون تحليل وراثي؟

٥ تزوج رجل فصيلة دمه (A) من امرأة فصيلة دمها (O).

فما هي فصائل الدم المتوقعة للأبناء؟ وضح بالتحليل الوراثي.



الفصل الدراسي الثاني




٦ ما فصائل الدم المحتمل توارثها للأبناء عند تزواج رجل فصيلة دمه (AB) مع امرأة فصيلة دمها (O) ؟

٧ أم فصيلة دمها (B) أنجبت طفل فصيلة دمه (A) فما الطرز الجينية المحتملة للأبوين وبقية الأبناء ؟ **فسر ذلك على أسس وراثية.**

اجب بنفسك


٨ لا يمكن إثبات نسب طفل يحمل فصيلة الدم (O) لأب فصيلة دمه (A) وأم فصيلة دمها (AB) **فسر هذه العبارة على أسس وراثية.**

اجب بنفسك



٩ زوجان لهما نفس فصيلة الدم، أنجبا ولدين لكل منهما فصيلة دم تختلف عن الآخر، وعن الأبوين فإذا علمت أنه يمكن وراثيا نقل دم أي من الوالدين إلى أي من الأبوين. **وضح على أسس وراثية التراكيب الوراثية (الطرز الجينية) للأبوين والوالدين.**

عامل الريسوس



انتقال الأجسام المضادة من دم الأم إلى دم الجنين الثاني عبر المشيمة

عامل الريسوس هو مولدات التصاق توجد على سطح خلايا الدم الحمراء بالإضافة إلى مولدات التصاق فصائل الدم.

ينقسم البشر تبعاً لوجود عامل الريسوس في دمائهم إلى:

- موجب عامل الريسوس (Rh^+) تحتوي دمائهم على مولدات التصاق عامل الريسوس، ويمثلون نحو ٨٥% من البشر.
- سالب عامل الريسوس (Rh^-) لا تحتوي دمائهم على مولدات التصاق عامل الريسوس، ويمثلون نحو ١٥% من البشر.

وراثية عامل الريسوس:


- يتحكم في وراثية عامل الريسوس ثلاثة أزواج من الجينات يحملها زوج واحد من الكروموسومات.
- وجود جين أو أكثر من أزواج الجينات الثلاثة في صورة سائدة يؤدي إلى تكون مولدات عامل الريسوس فيصبح الفرد موجب عامل الريسوس (Rh^+) بينما الفرد سالب عامل الريسوس (Rh^-) تكون جميع جيناته متنحية.

أهمية تحديد عامل الريسوس:

- تجنب المخاطر الناشئة عن تكوين أجسام مضادة لمولدات عامل الريسوس بسبب تكسير خلايا الدم الحمراء، لذلك يجب عدم إغفال تحديد عامل الريسوس قبل عمليات نقل الدم وقبل الزواج.

دور عامل الريسوس (Rh) في عمليات الحمل والولادة:

- إذا تزوج رجل (Rh^+) من امرأة (Rh^-) وحملت الأم بجنين (Rh^+) يحدث الآتي:
- في الحمل الأول يختلط جزء من دم الجنين (Rh^+) مع دم أمه فينبه جهازها المناعي لإنتاج أجسام مضادة لمولدات الالتصاق الخاصة بعامل الريسوس والتي عادة لا تصيب هذا الجنين بأذى وتبقى في دم الأم.
- في الحمل الثاني إذا كان الجنين (Rh^+) ينتقل بعضا من الأجسام المضادة التي تكونت في الحمل الأول من دم الأم إلى دم الجنين عبر المشيمة فتعمل على تكسير خلايا دم الجنين وإصابته بأنيميا حادة قد تؤدي إلى موته.




الإجراء الوقائي في حالة اكتشاف هذه الحالة قبل ولادة الطفل الأول:

إعطاء الأم مصل في خلال ٧٢ ساعة بعد كل ولادة لوقاية الطفل القادم حيث يقوم هذا المصل بتكسير كمية الدم التي تحتوي على (Rh^+) والتي اختلطت بدم الأم من الطفل السابق وذلك قبل أن تحت الجهاز المناعي للأم لتكوين أجسام مضادة.

ثانياً : الجينات المتكاملة

جينات تشترك فيما بينها لإظهار الصفة الوراثية حيث يتحكم في توريث هذه الصفة زوجان من الجينات ويتوقف ظهور الصفة السائدة على وجود جين سائد واحد على الأقل من كل زوج، أما غياب أي من الجينات السائدة أو كلاهما سيؤدي إلى عدم ظهور الصفة السائدة وتظهر الصفة المتنحية.

- تكون النسبة في الجيل الأول ١٠٠% سائد وفي الجيل الثاني ٩ (سائد): ٧ (متنحي).
- ومن أمثلة الجينات المتكاملة توارث صفة لون الأزهار في نبات بسلة الزهور حيث يمثل اللون القرمزي للأزهار الصفة السائدة، بينما يمثل اللون الأبيض الصفة المتنحية.
- عند تهجين نبات أزهاره بيضاء ($AAbb$) مع نبات أزهاره بيضاء ($aaBB$) ينشأ الجيل الأول من النباتات ذات أزهار قرمزية ($AaBb$) بنسبة ١٠٠% إذ تجمع جين سائد واحد من كل زوج.
- عند ترك نباتات الجيل الأول تلقح نفسها ذاتياً وزرع بذورها، ينشأ الجيل الثاني من النباتات ذات أزهار قرمزية وبيضاء وذلك بنسبة ٩:٧ علي الترتيب. يمكن التعبير عن ذلك بالتحليل الوراثي الآتي:





الفصل الدراسي الثاني

التفسير:

- يلزم لإظهار الصفة السائدة تجمع جين سائد أو أكثر من كلا الزوجين لأن كلا الجينين السائدين يشاركان في إظهار الصفة السائدة حيث يتحكم كل منهما في إنتاج إنزيم معين يؤثر على تكوين صبغة اللون.
- وهذا يدل على تكامل عمل الجينات حيث يمكن في هذه الحالة الحصول على الصفة السائدة من أبوين يحملان الصفة المتنحية.
- ولاحظ أن نتيجة الجيل الثاني في حالة الجينات المتكاملة (الصفات اللامندلية) تكون ٩:٧ (زوج واحد من الصفات المتقابلة) بينما نسبة الجيل الثاني في حالة قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية للصفات المندلية تكون ٩:٣:٣:١ (زوجين من الصفات المتقابلة).

تطبيقات على الجينات المتكاملة

وضح على أسس وراثية: الطرز المظهرية والجينية صفة لون أزهار نبات بسلة الزهور الناتجة عن التهجينات التالية: (١) $Aabb \times aaBb$ (٢) $AaBb \times aabb$





تم تلقيح نباتان من بسلة الزهور بيضاء الأزهار فنتجت أفراد الجيل الأول كلها قرمزية اللون ، فما الطرز الجينية والمظهرية للآباء وأبناء الجيل الثاني ؟

كيف يمكن الحصول على أفراد تحمل الصفة السائدة من تزاوج أبوين يحملان جينات الصفة المتنحية لنفس الصفات الوراثية . وضح ذلك على أسس وراثية.


وضح لون الأزهار الناتجة عن التهجينات الآتية في بسلة الزهور:

- أ- $AAbb \times AaBb$ ب- $aabb \times aaBb$ ج- $aabb \times AABb$ د- $AaBB \times AaBb$
- هـ- $AaBb \times Aabb$ و- $aaBb \times Aabb$ ز- $aaBb \times AAbb$




- (أ) ٣ قرمزي : ٥ أبيض.
- (ب) ١ قرمزي : ٣ أبيض.
- (ج) ١ قرمزي : ١ أبيض.

عند تهجين نبات بسلة الزهور ابيض الأزهار مع آخر قرمزي الأزهار كان $\frac{8}{3}$ الناتج قرمزي الأزهار و $\frac{8}{5}$ الناتج أبيض الأزهار، فما الطرز الجينية للأبوين ؟ فسر على أسس وراثية.




تمثل هذه الحالة جينات متكاملة :



عند تهجين نباتين من بسلة الزهور كلاهما أبيض الأزهار كان ثلاثة أرباع الناتج أبيض الأزهار وربع الناتج قرمزي، فما الطرز الجينية للأبوين؟

(١) هذه حالة جينات متكاملة ويلزم لإظهار الصفة

السائدة (اللون الأسود) تجمع بين سائد على الأقل في كلا الزوجين، أما لو وجد زوج واحد منهما في صورة سائدة والآخر في صورة متنحية يظهر اللون البني.



في إحدى سلالات الكلاب حدث تزاوج بين فردين
لونهما بني فكانت أفراد الجيل الأول جميعها سوداء اللون
وفي الجيل الثاني ظهرت أفراد بنية اللون وأخرى سوداء
بنسبة ٩: ٧ على الترتيب، فما:

(أ) سبب ظهور اللون البنى ثانية.

(ب) ناتج تزاوج أحد أفراد الجيل الأول مع أحد الآباء.

ثالثاً : الجينات المهيبة

جينات وراثية عندما توجد بصورة نقية (سائدة أو متنحية) تسبب أضراراً للكائن الحي يترتب عليه تعطيل بعض العمليات الحيوية مما يؤدي إلى موت الكائن الحي في مراحل مختلفة من العمر لربع نسل الأبوين غالباً.

أنواع الجينات المهيمنة:

جینات مہیتہ سائڈ: مثل:

- جين لون الشعر الأصفر في الفئران. - جين سلالة البولدوج في الأبقار.

جینات مہیۃ منجیۃ: مثل:

- جين غياب الكلورفيل في نبات الذرة. - جين العتة الطفولي في الإنسان.

(أ) وراثۃ صفة لون شعر الفئران:

- يسود شعر الفئران الأصفر (Y) على لون شعر الفئران الرمادي (y).



- وجود زوج من جينات اللون الأصفر السائدة النقية يتسبب في موت الفئران الصفراء داخل الرحم.

- تمثل الفئران الميئة حوالي ربع النسل الناتج (٢٥%).

- يتم وراثه هذه الصفة من خلال آباء هجينه في التركيب الجينى.

الفصل الدراسي الثاني

ويمكن تفسير ذلك على أسس وراثية كالتالي:




مثال: ما نسبة الفاقد من الفئران عند تهجين ذكر أصفر اللون مع أنثى رمادية اللون ؟

فسر ذلك على أسس وراثية.

لا توجد فاقد في الفئران ويرجع ذلك إلى عدم اجتماع زوج الجينات السائدة المميتة معاً (لا توجد فئران صفراء نقية بين أفراد الجيل الناتج).

(ب) وراثية صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة:

- يسود جين وجود الكلوروفيل (C) في نبات الذرة على جين غياب الكلوروفيل (c).
- عند تلقيح بعض نباتات الذرة تلقحاً ذاتياً ثم زراعة الحبوب الناتجة منها لوحظ نمو بعض البادرات خالية من الكلوروفيل (بيضاء اللون) تنمو لفترة قصيرة ثم تذبل وتموت بسبب جين مميت متنحى يوجد بصورة نقية وهو جين غياب الكلوروفيل.





- وجود زوج من جينات غياب الكلوروفيل في بعض البادرات يؤدي إلى عدم تكون مادة الكلوروفيل التي تكسب النباتات لونها الأخضر والمسئولة عن امتصاص الطاقة الضوئية لإتمام عملية البناء الضوئي.

تمثل البادرات التي تذبل وتموت ربع النسل الناتج (٢٥%).

يتم وراثية هذه الصفة من خلال أباء هجينة في التركيب الجيني.


ويمكن تفسير ذلك على أسس وراثية:





مثال: يوجد في بعض الأطفال مرض وراثي يعرف بالعتة الطفولي يسبب الموت لو وجدت جيناته المتنحية (aa) فسر على أسس وراثية نتيجة زواج رجل من امرأة كلاهما هجين في هذه الصفة.

تطبيقات على الجينات الميئة



١ في سلالة من القطط العادية وضعت أنثى ٣ قطط عادية وقطة واحدة متضخمة الرأس عاشت لعدة ساعات ثم ماتت. فسر على أسس وراثية.

٢ حدث تهجين بين ذكر وأنثى من الفئران كل منهما أصفر اللون فكانت نسبة الجيل الناتج ١:٢ وليست ١:٣. فسر ذلك على أسس وراثية.

أجب بنفسك

٣ عند إنبات بذور الذرة في الحقل، لوحظ ظهور بادرات بيضاء اللون عاشت لفترة قصيرة ثم ذبلت وماتت. فسر ذلك على أسس وراثية.

أجب بنفسك

٤ العتة الطفولي مرض مميت يسببه جين متنحى (d) إذا كان في حالة نقية، فما احتمالات ظهور هذا المرض عند تزواج رجل من امرأة كل منهما هجين ؟


أجب بنفسك

٥ إذا علمت أن جين (s) المتنحى يسبب حالة أنيميا الخلايا المنجلية ويسبب الموت قبل سن العاشرة إذا كان في حالة نقية، فما هي احتمالات توارث هذه الصفة في حالة تزواج رجل من امرأة كل منهما تركيبة الجيني (Ss).

أجب بنفسك

تأثير الظروف البيئية على فعل بعض الجينات

- أثبتت البحوث الحديثة أن بعض الجينات يتأثر عملها بالعوامل المحيطة بالكائن الحي، مثل:
- ملوثات الهواء.
 - نقص الأكسجين.
 - التعرض للإشعاعات.
 - العوامل البيئية (كالضوء والحرارة).
- دراسة هذه العوامل تساعد في تجنب المخاطر التي قد تنشأ عنها.
- تأثير غياب الضوء على ظهور صفة الكلوروفيل في النباتات الخضراء:

الملاحظة	الأشكال التوضيحية	الخطوات
١- تنمو بادرات خضراء. (شكل (١)) ٢- تنمو بادرات صفراء تذبل وتموت بعد فترة. (شكل (٢))	 شكل (١) شكل (٢)	١- استنبت مجموعة من حبوب القمح أو بذور الفول في مكان مضئ مع ري البادرات بانتظام لعدة أيام. ٢- استنبت مجموعة مماثلة في حجرة مظلمة مع ري البادرات بانتظام لعدة أيام.

الاستنتاج والتفسير: يحتاج الجين المسئول عن تكوين الكلوروفيل في النباتات الخضراء إلى عامل الضوء لكي يظهر تأثيره.

ملاحظات:

- ١- عند غياب الجين المسبب لظهور الكلوروفيل يعجز النبات عن تكوين صبغ الكلوروفيل حتى لو وضع في الضوء.
- ٢- تكون أوراق الكرب الداخلية بيضاء لأنها غير معرضة للضوء اللازم لكي يظهر تأثير جين صفة الكلوروفيل الأخضر على عكس الأوراق الخارجية التي تتميز باللون الأخضر. لتعرضها المستمر للضوء مما يساعد في تكوين الكلوروفيل.
- ٣- عند تعريض أوراق الكرب الداخلية للضوء تتحول إلى اللون الأخضر لظهور تأثير جين الكلوروفيل الأخضر.

الفصل الثالث : الوراثة الجنسية والأمراض الوقائية

تحديد الجنس في الإنسان:

- مع اكتشاف الكروموسومات الجنسية توصل العلماء إلى أن الرجل هو المسئول عن تحديد جنس الجنين وليس المرأة كما كان معتقد قديماً.
- يوجد في نواة الخلايا الجسدية للإنسان ٢٣ زوجاً من الكروموسومات تنقسم إلى:
 - ١- كروموسومات جسدية: عددها ٢٢ زوجاً وهي متشابهة في الذكر والأنثى.
 - ٢- كروموسومات جنسية: عددها زوج واحد وهي تختلف في الذكر عن الأنثى.

ويمكن التمييز بين خلايا أنثى الإنسان وخلايا ذكر الإنسان كالتالي:


أولاً: خلايا الأنثى

- تحتوي كل خلية جسدية على ٢٢ زوجاً من الكروموسومات الجسدية وزوج متماثل من الكروموسومات الجنسية (XX).
- تركيبها الصبغي (XX+٤٤).
- تنتج نوع واحد من البويضات كل منهما يحتوي على الصبغي (X) فيكون التركيب الصبغي للبويضة (X+٢٢).

ثانياً: خلايا الذكر

- تحتوي كل خلية جسدية على ٢٢ زوجاً من الكروموسومات الجسدية وزوج غير متماثل كم الكروموسومات الجنسية (XY).
- تركيبها الصبغي (XY+٤٤).
- تنتج نوعين من الحيوانات المنوية بنسب متساوية وهما:
 - حيوانات منوية تحتوي الصبغي (X) فيكون التركيب الصبغي لكل منها (X+٢٢).
 - حيوانات منوية تحتوي الصبغي (Y) فيكون التركيب الصبغي لكل منها (Y+٢٢).
 - يختلف الكروموسوم (X) عن الكروموسوم (Y) في الحجم ونوع الجينات التي يحملها كل منهما.

عند تزاوج رجل بامرأة فإن التحليل الوراثي الذي يوضح احتمالات إنجاب الذكور والإناث يكون كالتالي:



- إذا أخصبت البويضة (X+٢٢) بحيوان منوي (X+٢٢) يتكون جنين أنثى (XX+٤٤).
- إذا أخصبت البويضة (Y+٢٢) بحيوان منوي (Y+٢٢) يتكون جنين ذكر (YY+٤٤).
- أي أن: الحيوانات المنوية (الذكر) هي المسئولة عن تحديد جنس الجنين وليس البويضات.

الجينات المحمولة على الكروموسومات (X)، (Y) والمسئولة عن تحديد الجنس تعمل في الأشهر الأولى من الحمل، فإذا كان الجنين:

- ١- يحمل الكروموسوم (Y) فإنه يبدأ بعد ٦ أسابيع من بداية الحمل في إنتاج هرمونات تحت أنسجة المناسل (غير المتمايزة) لتكوين الخصيتين ثم تتمايز باقي الأعضاء التناسلية الذكرية.
- ٢- لا يحمل الكروموسوم (Y) فإنه يبدأ بعد ١٢ أسبوعاً من بداية الحمل في تكوين المبيضين ثم تتمايز باقي الأعضاء التناسلية الأنثوية.

الحالات الكروموسومية الشاذة في الإنسان

تنشأ الحالات الكروموسومية الشاذة نتيجة زيادة أو نقص عدد الصبغات (الكروموسومات) الجنسية أو الجسدية في الأمشاج عند تكوينها أثناء الانقسام الميوزي مما يؤدي إلى تكوين أفراد غير طبيعيين بعد حدوث الإخصاب.

- من أمثلة الحالات الكروموسومية الشاذة:

١- حالة كلاينفلتر:

اكتشفها الدكتور هنري كلاينفلتر عام ١٩٤٢ م.

أسبابها:

- إخصاب بويضة شاذة ($XX+22$) بحيوان منوي ($Y+22$) فيكون التركيب الصبغي للجنين الناتج ($XXY+44$) فينمو إلى ذكر شاذ.
- يؤدي وجود الصبغي (X) الزائد إلى حدوث اختلال في الهرمونات الجنسية لأن الجينات الأنثوية المحمولة على الصبغي (X) تعبر عن نفسها بدرجة ما.

أعراضها:

- ١- ذكر عقيم نتيجة غياب الخلايا المولدة للحيوانات المنوية.
- ٢- ظهور بعض الصفات الأنثوية مثل نمو حجم الثديين.
- ٣- التأخر العقلي.
- ٤- طول القامة ونمو الأطراف أكثر من النمو الطبيعي لها.

٢- حالة تيرنر:

أسبابها:

- إخصاب بويضة شاذة ($O+22$) بحيوان منوي ($X+22$) فيكون التركيب الصبغي للجنين الناتج ($XO+44$) فينمو إلى أنثى شاذة.
- يؤدي نقص الصبغي (X) مما يحمله من جينات لصفات جنسية وغير جنسية إلى نمو أنثى بها العديد من التشوهات.

أعراضها:

- ١- أنثى لا تصل إلى مرحلة البلوغ لعدم وجود كمية كافية من الهرمونات.
- ٢- ظهور بعض العيوب الخلقية في القلب والكلى.
- ٣- نمو عقلي بطئ.
- ٤- قصر القامة.

٣- حالة داون (الطفل المغولي):

- اكتشفها الطبيب البريطاني داون عام ١٨٦٦ م.

أسبابها:

- إخصابها بين مشيج طبيعي ومشيج شاذ (حيوان منوي أو بويضة) يحمل زوجا كاملا من الكروموسومات الجسدية رقم ٢١ فيكون التركيب الصبغي للجنين ($XY+45$) إذا كان أنثى، فينمو إلى طفل (ذكر أو أنثى) يحمل في كل خلية من خلايا الجسم ٣ نسخ من الكروموسوم رقم ٢١.

أعراضها:

- ١- نمو متأخر.
- ٢- وجه بيضاوي.
- ٣- الفهم متأخر (تخلف عقلي).
- ٤- قصر القامة.
- ٥- مؤخرة الرأس مسطحة.
- ٦- أصابع القدمين واليدين قصيرتان.
- ٧- الأذن صغيرة.
- ٨- العيون محدبة.



الصفات المرتبطة بالجنس

اكتشف العالم توماس مورجان أثناء دراسته لصفة لون العيون في حشرة الدروسوفيل أن جينات بعض الصفات الجسدية تقع على الكروموسومات الجنسية (X,Y) لذلك أطلق عليها "الصفات المرتبطة بالجنس".

الصفات المرتبطة بالجنس:


صفات تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية (X,Y) ولا يتأثر ظهورها بالهرمونات الجنسية.

(أ) الصفات المرتبطة بالجنس في حشرة الدروسوفيل:

صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيل:

- قام مورجان بتهجين ذكر أبيض العينين (X^rY) مع أنثى حمراء العينين ($X^R X^R$)، فنشأت جميع أفراد الجيل الأول ذات عيون حمراء مما يدل على أن صفة العين الحمراء سائدة على صفة العين البيضاء.
- ترك أفراد الجيل الأول تتزاوج ذاتياً، فتنشأ أفراد الجيل الثاني حمراء العينين وبيضاء العينين بنسبة ٣:١ على الترتيب وقد لاحظ أن جميع الأفراد ذات العيون البيضاء كانت ذكوراً.
- كان يمكن لمورجان أن يعتبر صفة لون عيون حشرة الدروسوفيل صفة مندلية حيث نشأ الجيل الأول بنسبة ١٠٠% للصفة السائدة ولكنه لاحظ أن ربع الجيل الثاني (٢٥%) الذي يحمل الصفة المتنحية (لون العيون البيضاء) جميعه من الذكور لذلك اعتبرها مورجان صفة مرتبطة بالجنس حيث تحمل هذه الصفات على الصبغي الجنسي (X) بينما الصبغي الجنسي (Y) لا يحمل سوى القليل منها.

ويمكن تفسير ذلك وراثياً كما هو مبين بالرسم.



(ب) الصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان:

يحمل الكروموسوم (X) في الإنسان جينات مسئولة عن بعض الصفات الجسدية، مثل:

- عمى الألوان. - الهيموفيليا (سيولة الدم). - قصر النظر. - ضمور العضلات.

١- حالة عمى الألوان:

حالة وراثية تسبب عدم القدرة على تمييز الألوان وخصوصا الأحمر والأخضر.

- يسبب حالة عمى الألوان جين متنحي محمول على الكروموسوم (X).

- يسبب هذا الجين عدم القدرة على تمييز الألوان خاصة الأحمر والأخضر.

مثال: عند تزواج رجل مصاب بعمى الألوان من أنثى سليمة (نقية) فإن الجيل الناتج تكون جميع أفرادها سليمة.

ويمكن تفسير ذلك وراثيا كما هو مبين بالرسم.

٢- حالة الهيموفيليا (سيولة الدم):

حالة وراثية تسبب سيولة في الدم نتيجة عدم تكون بعض المواد الضرورية لتجلط الدم.

- يسبب حالة الهيموفيليا جين متنحي محمول على الكروموسوم (X).

- يسبب هذا الجين سيولة في الدم نتيجة عدم تكوين بعض المواد الضرورية لتجلط الدم.

- مرض الهيموفيليا قد يسبب الموت خاصة في مرحلة الطفولة.

مثال: عند تزواج رجل غير مصاب بالهيموفيليا من امرأة حامله للمرض ينشأ جيل يجمع بين الأفراد السليمة والمريضة.

يمكن تفسير ذلك وراثيا كالتالي:

١- الصفات المرتبطة بالجنس (في الإنسان أو الدروسيفيلا):

- في الذكور تمثل بجين واحد فقط ، لأن الصبغي (Y) لا يحمل جينات صفة عمى الألوان.



- في الإناث تمثل بزواج من الجينات لأن خلايا الأنثى تحتوي على زوج من الصبغيات الجنسية (XX).

٢- الذكر يورث الصفة لبناته ولا يورثها لأبنائه الذكور لأنه يورث الصبغي (Y) للذكور والصبغي (X) الذي يحمل جين الصفة للبنات.

٣- الذكر يورث الصفة لأحفاده الذكور عن طريق بناته.


٤- الأم تورث الصفة لأبنائها الذكور والإناث.

٥- الأبناء الذكور يرثون باستمرار الجين المرتبط بالجنس من الأم بينما تظهر الصفة على البنات عندما تحصل على جين الصفة من كل من الأب والأم.




تطبيقات على الصفات المرتبطة بالجنس

١ ما ناتج تهجين ذكر دروسوفيا أحمر العيون مع أنثى بيضاء العيون في الجيلين الأول والثاني. فسر ذلك على أسس وراثية.



٢ في إحدى التجارب على الصفات المرتبطة بالجنس، كانت نتيجة تزاوج ذكر أحمر العيون مع أنثى حمراء العيون هي ٢٥% ذكر حمراء العيون، ٥٠% إناث حمراء العيون، ٢٥% ذكور بيضاء العيون، فسر ذلك على أسس وراثية.




٣ إذا تزاوج ذكر وأنثى دروسوفيا وكانت أفراد الجيل الناتج تجمع بين ذكور حمراء العيون، ذكور بيضاء العيون، إناث حمراء العيون، وإناث بيضاء العيون بنسبة ١:١:١:١.

(أ) ما الطرز الجينية والمظهرية للأباء ؟
(ب) ما الطرز الجينية للأبناء ؟

٤ إمراة طبيعية كان والدها مصابا بعلمي الألوان، تزوجت من رجل طبيعي.

فما الطرز الجينية والمظهرية المحتملة للأبناء ؟




٥ إذا تزوجت امرأة متباينة الألقحة بالنسبة لعلمي الألوان من رجل لا يميز اللونين الأحمر من الأخضر.

(أ) وضع جميع التراكيب الجينية للأمشاج.

(ب) وضع الطرز الجينية والمظهرية المحتملة للأبناء.

(ج) حدد النسبة المئوية للطرز المظهرية المختلفة لهذه الصفة.



الفصل الدراسي الثاني

٦ زوجان لا تظهر عليهما أعراض مرض عمي الألوان أنجبا ذكرا مريضا بهذا المرض ، وضح التفسير الوراثي لذلك؟

أجب بنفسك

٧ أنجبا زوجان لا تظهر عليهما أعراض الهيموفيليا أبناء مريضة بالهيموفيليا (نزف دم)، فسر ذلك على أسس وراثية، فسر ذلك على أسس وراثية.

٨ إذا كان الزوج دمه طبيعي إلا أن أباه كان مصابا بنزف الدم، وزوجته سليمة كما لم يعرف في تاريخ أسرتها هذا المرض، فما احتمالات الإصابة بهذا المرض بين الأبناء؟ فسر ذلك على أسس وراثية.

٩ لا يمكن ولادة طفل ذكر مصاب بعمي الألوان من أب مصاب بالمرض أم سليمة . فسر ذلك على أسس وراثية.

أجب بنفسك

الصفات المتأثرة بالجنس

صفات وراثية تحمل جيناتها على الكروموسومات الجسدية وليست الكروموسومات الجنسية ويعمل جنس الفرد أحيانا على تحويل سيادتها حيث يتأثر عمل الجين بالهرمونات الجنسية التي تفرزها المناسل في الذكور والإناث البالغة.

يعمل جنس الكائن الحي أحيانا على تحويل سيادة بعض الصفات، والتي تعرف بالصفات المتأثرة بالجنس.

من أمثلة الصفات المتأثرة بالجنس: - صفة القرون في الماشية

- صفة الصلع الوراثي في الإنسان - صفة قصر أصبع السبابة في الإنسان

صفة الصلع الوراثي في الإنسان:


- تنتشر بين رجال بعض العائلات أكثر من النساء.

- يتحكم في إظهار جين سائد يتأثر بهرمونات الذكورة فقط، لذلك ففى:

الأنثى	الذكر
تظهر الصفة في التركيب الجيني النقي (B^+B^+) فقط فتعاني من تساقط الشعر الوراثي ولا تظهر الصفة في التركيب الجيني الهجين (B^+B) والتركيب الجيني (BB).	تظهر الصفة في التركيب الجيني النقي (B^+B^+) والتركيب الجيني الهجين (B^+B) نتيجة تأثر هرمونات الذكورة فيعاني من الصلع الوراثي ولا تظهر الصفة في التركيب الجيني (BB).

وبالتالي نجد أن التركيب الجيني الهجين (B^+B) يختلف في مظهره في الذكر عن الأنثى.

مثال: تزوج رجل أصلع هجين (B^+B) من امرأة لا تعاني من سقوط الشعر هجينة (B^+B)، فكانت النتائج كالتالى:



المارش في الأحياء اث

مما سبق يمكن المقارنة بين الصفة المرتبطة بالجنس والصفة المتأثرة بالجنس كالتالي:

وجه المقارنة	الصفة المرتبطة بالجنس	الصفة المتأثرة بالجنس
موقع جين الصفة	توجد على الصبغيات الجنسية.	توجد على الصبغيات الجسدية.
التأثر بالهرمونات	لا تتأثر بالهرمونات الجنسية.	تتأثر بالهرمونات الجنسية.
سيادة الجينات	يسود أحد الجينين على الآخر سيادة تامة.	الجين السائد المفرد يتأثر بهرمونات الذكور فقط، ولا يعبر عن نفسه في الأنثى
الفرد الهجين	الإناث فقط.	الذكر الهجين يختلف في طرزه المظهري عن الأنثى الهجين.
توريث الجينات	الأب يورث لبناته فقط، والأم تورث للجنسين.	الأبوين يورثا للأبناء دون تمييز
أمثلة	مثال: - صفة لون العيون في الدروسوفيلا. - صفتي عمي الألوان والهموفيليا في الإنسان.	مثال: - صفة القرون في الماشية - صفتي الصلع الوراثي وقصر- أصبع السبابة في الإنسان.

الصفات المحددة بالجنس

صفات يقتصر ظهورها على أحد الجنسين دون الجنس الآخر نتيجة الاختلافات في الهرمونات الجنسية لدى كل جنس.

من أمثلة الصفات المحددة بالجنس:

- صفة إنتاج الحليب تكون قاصرة على الإناث فقط لأنها تحتوي على هرمونات جنسية معينة تساعد الجين في التعبير عن تأثيره.
- صفة ظهور اللحية تكون قاصرة على الذكور فقط وهي من الصفات الجنسية الثانوية في ذكر الإنسان.
- صفة وضع البيض تكون قاصرة على الإناث فقط مثل الطيور وبعض الحيوانات الأخرى.

الفحوصات الطبية قبل الزواج

أسباب الفحص الطبي للمقبلين على الزواج:

- 1- التأكد من خلوهما من:
الأمراض المعدية مثل: التهاب الكبد الفيروسي ، مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
الأمراض الوراثية مثل: أنيميا البحر المتوسط.
- 2- إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض السابقة للطرف الآخر أو على الأبناء في المستقبل.
- 3- إعطاء الخيارات والبدائل أمام المقبلين على الزواج من أجل مساعدتهم على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.

الفصل الدراسي الثاني

أهمية الفحص الطبي قبل الزواج:

- ١- العمل على إنجاب أطفال أصحاء.
 - ٢- الحد من انتشار الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي.
 - ٣- تجنب الأعباء المالية والنفسية والاجتماعية عند رعاية الأبناء المصابين بأمراض وراثية.
- يعتبر زواج الأقارب وعدم إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج من عوامل إنتشار الأمراض الوراثية.

العلم والتكنولوجيا والمجتمع (معلومة إثرائية)

١- البصمة الوراثية

اكتشاف البصمة الوراثية:

- عام ١٩٨٤م نشر **أليك جيفريز بجامعة ليستر** بلندن بحثاً أوضح أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات داخل الكائن الحي.

- عام ١٩٨٥م توصل هذا العالم إلى أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط وأطلق عليها اسم "البصمة (الطبعة) الوراثية".



DNA يحمل شفرة البصمة الوراثية

البصمة (الطبعة) الوراثية:

- تتابعات من المادة الوراثية تتكرر عدة مرات في الكائن الحي.
- وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقطع DNA.
- استخدامات البصمة الوراثية:

- ١- في مجال الطب: دراسة الأمراض الجينية وعمليات زرع الأنسجة.
- ٢- في مجال الطب الشرعي: التعرف على الجثث المشوهة - تتبع الأطفال المفقودين - الحكم في قضايا النسب - تبرة أو إدانة الأشخاص من جرائم القتل والاعتصاب.

٢- الجينوم البشري

يقدر عدد الجينات في الخلية بين ٨٠٠٠٠: ٦٠٠٠٠ جين محمولة على ٢٣ زوجاً من الكروموسومات وهذا العدد يسمى الجينوم البشري وهو المسئول عن إظهار الخصائص البشرية.


الجينوم البشري: كل الجينات التي توجد في نواة كل خلية جسمية.

اكتشاف الجينوم البشري: عام ١٩٥٣م أثبت **واطسون وكريك** أن الجينات تحمل على لولب مزدوج من الحمض النووي DNA.

- عام ١٩٨٠م ظهرت فكرة الجينوم البشري وتعرف العلماء على حوالي ٤٥٠ جيناً.
- في منتصف الثمانينات تعرف العلماء على حوالي ١٥٠٠ جين.

استخدامات الجينوم البشري:

- ١- تحديد الجينات المسببة للأمراض الوراثية من خلال رسم خريطة جيدة تحدد موقع الجينات على الكروموسومات بدقة.
- ٢- دراسة تطور الكائنات الحية من خلال مقارنة الجينوم البشري بغيره من الكائنات الحية.
- ٣- تحسين النسل من خلال التعرف على الجينات المرضية في الجنين قبل ولادته والعمل على تحسينها.
- ٤- صناعة العقاقير بلا آثار جانبية.



نموذج من كروموسومات الإنسان

المراجعة العامة على الباب الثالث

س١: الأسئلة العامة:

- ١- ما أهم اعمال كلا من جريجور مندل - ساتون وبوفري ؟
- ٢- أكتب عن النظرية الكروموسومية - الطرز الكروموسومي - الخرائط الصبغية ؟
- ٣- ما العلاقة بين الجين والكروموسوم ؟
- ٤- قارن بين الخلايا الجسدية والخلايا الجنسية.
- ٥- ما الفرق بين التقسيم الوراثي والتقسيم الكيميائي لفصائل الدم ؟
- ٦- ما أهمية فصائل الدم وما خطورة نقل الدم من شخص الى اخر؟
- ٧- وضح كيفية موت للطفل الثاني عند زواج رجل موجب ريسوس من امرأة سالبة ريسوس.
- ٨- ما هي الجينات المتكاملة؟ وما هي الجينات المميطة ؟
- ٩- وضح في جدول احتمالات نقل الدم بين الفصائل المختلفة ؟
- ١٠- اشرح كيفية تحديد فصائل الدم ؟
- ١١- قارن بين حالة كليفلتر وحالة داون ؟
- ١٢- كيف تظهر حالة العمى اللوني والهيوفيليا ؟
- ١٣- ما علاقة حالة الصلع بالهرمونات الذكرية ؟
- ١٤- ما المقصود بكل من: (مولدات الالتصاق في فصائل الدم - عامل الريسوس).
- ١٥- قارن بين كل مما يأتي: (١) الكروموسومات الجسدية والكروموسومات الجنسية في الإنسان. (٢) الكروموسوم (X) والكروموسوم (Y).
- ١٦- قارن بين الصفات المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس.

س٢: أذكر السبب العلمي (علل):

- ١- الزوج ٢٣ من الكروموسومات لا يخضع للترتيب التنازلي للحجم.
- ٢- الجاميتات خلايا أحادية الكروموسومات.
- ٣- يختلف الطرز الكروموسومي للذكر عن الأنثى في الكروموسومات الجنسية.
- ٤- لا توجد فئران صفراء نقية الطرز الجيني.
- ٥- تختلف وراثة لون أزهار نبات شب الليل عن لون أزهار نبات بسلة الزهور.
- ٦- ينتشر الصلع الوراثي بين رجال بعض العائلات أكثر من النساء.
- ٧- يختلف التركيب الصبغي للبويضة عن التركيب الصبغي للخلية الجسدية.
- ٨- في انعدام السيادة الطرز المظهري يدل على الطرز الجيني.
- ٩- فصائل الدم تعتبر حالة سيادة تامة وانعدام سيادة وتعدد بدائل.
- ١٠- تعرف فصيلة AB بالمستقبل العام وفصيلة O بالمعطي العام.
- ١١- أهمية تحليل Rh قبل الزواج.
- ١٢- قد تظهر الصفة السائدة من فردين يحملان الصفة المتنحية.
- ١٣- بعض الجينات لها أثر مميت.
- ١٤- موت بادرات الذرة البيضاء.

الفصل الدراسي الثاني

- ١٥- لا يورث الأب صفة عمى الألوان إلى أبنائه الذكور.
- ١٦- حالة كلاينفلتر تصيب الذكور فقط وحالة تيرنر تصيب الإناث فقط.
- ١٧- مرض عمى الألوان أكثر إنتشاراً في الذكور عن الإناث.
- ١٨- يمكن أن يعيش الحمل الثاني لإمرأة سالبة ريسوس متزوجة من رجل موجب ريسوس.
- ١٩- الأب هو المسئول عن تحديد جنس الجنين.
- ٢٠- يعاني مصاب حالة كلاينفلتر من العقم.

س٣: اكتب المفهوم العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- ترتيب الكروموسومات تنازلياً حسب حجمها وترقيمها.
- ٢- الوحدة البنائية لجزيء DNA.
- ٣- يتكون من الحمض النووي DNA والبروتين.
- ٤- حالة مرضية تنشأ نتيجة وجود صبغى زائد في زوج الكروموسومات رقم ٢١.
- ٥- نوع من مولدات الالتصاق يوجد في ٨٥% من البشر وقد يؤدي إلى موت الأجنة.
- ٦- جين يوجد في النبات ويتأثر ظهوره بعامل الضوء.
- ٧- زوج من الكروموسومات لا يخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم.
- ٨- مواد توجد على سطح خلايا الدم الحمراء (مولدات الالتصاق).
- ٩- مواد مضادة للمولدات توجد في بلازما الدم.
- ١٠- حالة وراثية يتوقف فيها ظهور الصفة السائدة على وجود جين سائد.
- ١١- جينات إن وجدت بصورة متماثلة تؤدي إلى موت الكائن الحي.
- ١٢- عدم القدرة على تمييز الألوان خاصة الأحمر والأخضر.
- ١٣- جينات تتأثر عملها بالهرمونات الجنسية.
- ١٤- حالة وراثية تسبب سيولة في الدم.
- ١٥- حالة وراثية بها عدد الصبغيات $(x+44)$.
- ١٦- حالة وراثية يكون عدد الصبغيات $(xx+44)$.
- ١٧- فصيلة دم تخلو من الأجسام المضادة وتسمى مستقبل عام.
- ١٨- انقسام يؤدي إلى اختزال عدد الصبغيات إلى النصف ويؤدي إلى تكوين الأمشاج.
- ١٩- خلايا تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة بالخلايا الجسدية.
- ٢٠- جينات تحمل على الصبغيات الجسدية ويتأثر ظهورها بالهرمونات الجنسية.

س٤: أعد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما تحته خط:

- ١- ترتيب الكروموسومات في الطرز الكروموسومي للإنسان حسب نوعها.
- ٢- يختلف الطرز الكروموسومي للذكر عن الأنثى في زوج الكروموسومات رقم ١٣.
- ٣- يحتوي الحيوان المنوي في الإنسان على نفس عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية.
- ٤- عدد الكروموسومات في خلية جلد الإنسان ضعف عدد الكروموسومات في البكرياس.
- ٥- زوج الكروموسومات الجنسية يكون XX في الذكر وXY في الأنثى.
- ٦- النسبة المميزة للجيل الثاني في قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية هي النسبة ٧:٩.
- ٧- توجد مولدات التصاق عامل الريسوس على سطح خلايا الدم البيضاء.
- ٨- يمثل التركيب الجيني (B^+B) أنثى مصابة بالصلع.

- ٩- نسبة الجيل الثاني في حالة الجينات المتكاملة هي ١:٣:٣:٩.
- ١٠- أكبر الكروموسومات حجماً في الإنسان هو زوج الكروموسومات الثاني عشر.
- ١١- لون الأزهار في نبات شب الليل من أمثلة حالة الجينات المتكاملة.
- ١٢- توجد مولدات الالتصاق في البلازما بدم الإنسان.
- ١٣- يتحكم في وراثه فصائل الدم أربعة أنواع من الجينات.
- ١٤- يطلق على فصيلة الدم (O) مستقبل عام بينما فصيلة الدم (AB) معطى عام.
- ١٥- تعتبر وراثه صفة الكوروفيل في نبات الذرة أمثلة الجينات المتكاملة.
- ١٦- تحتوى خلايا الجلد في أنثى الإنسان على ٢٣ زوجاً من الكروموسومات الجسدية.
- ١٧- البويضات هي التي تحدد جنس الجنين في الإنسان؟
- ١٨- تظهر حالة كلاينفلتر في الذكور بالتركيب الصبغي $X+44$.
- ١٩- تظهر حالة تيرنر في الإناث بالتركيب الصبغي $X+46$.
- ٢٠- وجود صبغى واحد من نوع (X) في خلايا أنثى الإنسان يدل على حالة داون.

س٥: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- ١- ترتب الكروموسومات تنازلياً حسب:

(عدد الجينات التي تحملها - نوع الجينات التي تحملها - حجمها - جميع ما سبق)
- ٢- إذا كان عدد الكروموسومات في خلية جلد الإنسان ٢٣ زوجاً، فإن عدد الكروموسومات في الحيوان المنوى زوجاً.
- ٣- يتميز زوج الكروموسومات الجنسية في الإنسان بالآتي:

(يلي زوج الكروموسوم (٧) في الحجم - يرتب في نهاية الكروموسومات - يحمل رقم (٢٣) - جميع ما سبق)
- ٤- النسبة الإنعزالية في الجيل الثاني للسيادة التامة: (١:٣ - ١:١ - ٣:١ - ١:٢)
- ٥- النسبة المميزة للجيل الثاني للسيادة التامة هي: (١:٣ - ١:١ - ٢:١ - ٣:١)
- ٦- ذكر وأنثى تركيبهما الجيني Aa وعند تزاوجهما فإن التركيب الجيني AA لأبناهما يحتمل أن يكون:

(٢٥% - ٥٠% - ٧٥% - ١٠٠%)
- ٧- إذا كان التركيب الجيني لأحد الأبناء هو aa، فإن التركيب الجيني للأبوين هو:

(aaXAA - aaXAa - AAXAA - AAXAa)
- ٨- عند تهجين نباتات بازلاء تحمل أزهار قرمزية Rr، فإن نسبة ظهور الأزهار البيضاء في الجيل الناتج:

(١٠٠% - ٧٥% - ٥٠% - ٢٥%)
- ٩- من أمثلة الصفات المحددة بالجنس في الإنسان: (الصلع الوراثي - ظهور اللحية - عمى الألوان الهيموفيليا)
- ١٠- وراثه صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة يتبع:

(الجينات المتكاملة - الجينات المميطة - انعدام السيادة - الارتباط التام)
- ١١- نسبة الجيل الثاني من تهجين فردين مختلفين في زوج من الصفات المتقابلة في حالة انعدام السيادة هي:

(١:٣ - ١:٢ - ١:١ - ٩:٧)
- ١٢- تقع جينات فصائل الدم على زوج الكروموسومات رقم: (٧ - ٩ - ٢٢ - ٢٣)
- ١٣- فصيلة الدم التي لا تحتوي على أي أجسام مضادة هي: (AB - O - B - A)

الفصل الدراسي الثاني

- ١٤- إذا حدث تخثر عند إضافة مصل مضاد (anti- a) إلى شريحة بها نقطة دم هذا الشخص هي:
(B أو A - AB أو A - AB أو B أو O - B أو A)
- ١٥- إذا حدث تخثر في كل من قطري الدم بعد إضافة المصل المضاد كانت فصيلة الفرد: (AB- O - B - A)
- ١٦- إذا كان أحد الآباء فصيلة دمه (AB) فلا يمكن أن ينجب طفل فصيلته: (AB- O - B - A)
- ١٧- تتضمن حالة فصائل الدم: (تعدد بدائل - سيادة تامة - انعدام سيادة - جميع ما سبق)
- ١٨- يتحكم في وراثة مولدات التصاق عامل الريسوس من الجينات.
- ١٩- تمثل صفة لون أزهار نبات بسلة الزهور حالة:
(زوج واحد - زوجين - ٣ أزواج - أربع أزواج)
- ٢٠- نسبة لون أزهار نبات بسلة الزهور في الجيل الثاني الناتج عن تهجين أزهار بيضاء (Aabb)(aaBB):
(٣:١ - ٩:٧ - ١:٢:١ - ٩:٣:٣:١)
- ٢١- نسبة الفاقد في حالة توارث الجينات المهيمنة تمثل % (٢٥ - ٥٠ - ٧٥ - ١٠٠)
- ٢٢- وراثة لون الفئران الصفراء تمثل حالة:
(جينات متكاملة - انعدام سيادة - جينات مهيمنة - جينات مرتبطة بالجسم)
- ٢٣- يتأثر جين تكوين الكلوروفيل في النبات بعامل بيئي هو: (الرطوبة - الحرارة - الضوء - الضغط)

الباب الرابع

التصنيف

الفصل الأول : أسس تصنيف الكائنات الحية

عملية التصنيف:

ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف بينها بحيث يسهل دراستها والتعرف عليها.
علم التصنيف: العلم الذي يهتم بتصنيف الكائنات الحية في مجموعات على أسس عملية.
أهمية التصنيف:

١- تسهيل التعرف على كائنات جديدة وإضافتها لمجموعتها المتشابهة.

٢- يقيد التصنيف الفروع الأخرى من العلوم.

اعتمد نظام التصنيف الحديث على تعريف النوع كمبدأ علمي وأساس في تصنيف الكائنات الحية.

النوع: مجموعة من الأفراد لها صفات مورفولوجية متشابهة، وتزاوج فيما بينها، وتنتج أفراد تشبهها وتكون خصبة (غير عقيمة).

هناك أفراد لا يطلق عليها مصطلح النوع لأنها أفراد عقيمة أي أنها غير قادرة على التزاوج وإنتاج جيل جديد من نفس النوع، مثل:

١- **التايجون:** ينتج من تزاوج أنثى الأسد مع ذكر النمر.

٢- **البغل:** ينتج من تزاوج أنثى الحصان مع ذكر الحمار.

تسمية الكائنات الحية.

العالم كارل ليننيوس: طور نظاماً لتسمية الكائنات أطلق عليه نظام التسمية الثنائية.
الشروط التي بها الأسماء العلمية للكائنات الحية:

١- أن تكتب باللغة اللاتينية.

٢- أن تكتب بحروف مائلة أو بوضع خط تحتها لتمييزها.

٣- يكتفي بإسم ثنائي لكل كائن حي في التسمية الثنائية:

- الأول يمثل الجنس Genus ويبدأ بحرف كبير.

- الثاني يمثل النوع species ويبدأ بحرف صغير.

مثال: الاسم العلمي للقطعة "Felis domesticus" حيث يمثل:

- Felis جنس القطعة. - domesticus نوع القطعة (المنزلية).

التسلسل الهرمي للتصنيف: توجد سبعة مستويات لتصنيف الكائنات الحية، كل مجموعة منها تضم كائنات أقل عدداً وأكثر اشتراكاً في الصفات عن المجموعة التي تسبقها.

المملكة (العالم): أعلى مستوى في الهرم التصنيفي للكائنات الحية وشمل مجموعة من الشعب.

الشعبة: تشمل مجموعة من الطوائف.


الطائفة: تشمل مجموعة من الرتب.

الرتبة: تشمل مجموعة من العائلات.
 العائلة (الفصيلة): تشمل مجموعة من الأجناس.
 الجنس: يشمل مجموعة من الأنواع.
 النوع: يشمل مجموعة من الأفراد لها القدرة على التزاوج وإنتاج نسل خصب من نفس النوع.
 - توجد مجموعة أخرى تتوسط كل مجموعتين متتاليتين من المجموعات السابقة مثل تحت الشعبة وتحت الطائفة.

المفتاح التصنيفي

تعريف: سلسلة من الأوصاف مرتبة في أزواج، تقود المستخدم لتعريف كائن حي غير معلوم بالنسبة له.
أهميته: يستخدمه علماء الأحياء لمساعدتهم في التعرف على الكائنات الحية.
كيفية تصميمه:

- 1- يبدأ بخصائص واسعة على أن تصبح أكثر تحديدا وخصوصية كلما تقدمنا في مستويات المفتاح التصنيفي.
 - 2- يتم اختيار احد وصفين على أساس خصائص الكائن الحي خلال كل خطوة.
 - 3- في النهاية تصل إلى وصف يقودك لإسم الكائن أو المجموعة التي ينتمي إليها.
- مثال: يوضح المفتاح التصنيفي الثاني لخمسة أنواع من الحشرات:



الفصل الثاني : التصنيف الحديث للكائنات الحية

محاولات تصنيف الكائنات الحية

الفيلسوف اليوناني ارسطو (من أكثر من ٢٢٠٠ سنة): أول من قسم:
- الحيوانات إلى حيوانات ذات دم أحمر وحيوانات عديمة الدم. - النباتات إلى أشجار وأعشاب.
العالم كارل ليننيوس (عام ١٧٠٠ م): وضع نظام التصنيف التقليدي حيث صنف الكائنات الحية في مملكتين هما:
- المملكة الحيوانية. - المملكة النباتية.
العالم روبرت فيتكر (عام ١٩٦٩ م): وضع نظام التصنيف الحديث حيث صنف الكائنات الحية إلى خمس ممالك هم:

- البدائيات. - الطلائعيات. - الفطريات. - النبات. - الحيوان.
وهو النظام المتعارف عليه في الوسط العلمي حتى الآن.
- هناك بعض الكائنات لا تخضع لتصنيف فيتكر وهي تشمل الفيروسات، والفيريودات، والبريونات.

أولاً : مملكة البدائيات

الخصائص العامة لمملكة البدائيات:


المعيشة: تعيش مفردة أو في مستعمرات.
التركيب: يتكون جسمها من خلية واحدة.
النواة: أولية أي غير محددة الشكل والمادة الوراثية توجد في السيتوبلازم وغير محاطة بغشاء نووي.
الجدار الخلوي: يخلو من السليلوز أو البكتين.
السيتوبلازم: يغيب عنه الكثير من العضات الغشائية مثل: الميتوكوندريا والبلاستيدات وجهاز جولجي والشبكة الإندوبلازمية.

تصنيف مملكة البدائيات في مجموعتين مختلفتين هما:

١. البكتريا القديمة:

المعيشة: يعيش معظمها في البيئات ذات الظروف القاسية للغاية مثل:
- ينابيع المياه الحارة. - البيئات الخالية من الأكسجين. - البيئات عالية الملوحة.
تختلف في تركيب الغشاء الخلوي والجدار الخلوي عن البكتريا الحقيقية.
٢. البكتريا الحقيقية:

المعيشة: تعيش في كل مكان وبجميع بيئات الأرض مثل: الهواء واليابسة والمياه.
التغذية: بعضها ذاتي التغذية مثل: البكتيريا الخضراء المزرقة ومنها النوستوك والبعض الآخر غير ذاتي التغذية.
التكاثر: لا جنسي بالإنشطار الثنائي. الأشكال: لها عدة أشكال منها.



ثانياً : مملكة الطلائعيات

الخصائص العامة لمملكة الطلائعيات:

- التركيب: غير معقدة فمعظمها وحيد الخلية ، والقليل منها عديد الخلايا .
- النواة: حقيقية أي تحاط فيها المادة الوراثية بغشاء نووي يفصلها عن السيتوبلازم .
- الجدار الخلوي: يوجد في بعضها.
- السيتوبلازم: يحتوي على بلاستيدات.
- تصنف مملكة الطلائعيات إلى عدة شعب أهمها ما يلي:

١ - شعبة الأوليات الحيوانية

المعيشة:

- بعضها يعيش حر في صورة مفردة أو في مستعمرات في المياه العذبة والمالحة والأراضي الرطبة.
- بعضها يتطفل على النباتات والحيوانات مسبباً لها الأمراض.

التركيب: حيوانات مجهرية وحيدة الخلية.

التكاثر: تتكاثر جنسياً ولا جنسياً.

تصنف شعبة الأوليات إلى أربع طوائف حسب وسيلة التحرك هي:

- ١- طائفة اللحميات: تتحرك بالأقدام الكاذبة (امتدادات مؤقتة من الجسم) مثل: الأميبا.
- ٢- طائفة الهدديات: تتحرك بالأهداب (تحيط بالجسم) مثل: البراميسيوم.
- ٣- طائفة السوطيات: تتحرك بالسواط، مثل: التريبانوسومات تقع بين كرات دم شخص مصاب بمرض النوم (تتطفل على الإنسان وتصيبه بمرض النوم).
- ٤- طائفة الجرثوميات: مثل: البلازموديوم، تنتج أطواراً تسمى الجراثيم.
- ليس لها وسيلة للحركة مثل: البلازموديوم (يتطفل على الإنسان ويصيبه بمرض الملاريا).

٢ - شعبة اليوجلينيات

التركيب: كائنات وحيدة الخلية.

السيتوبلازم: يحتوي على بلاستيدات خضراء وتقوم بعملية البناء الضوئي.


وسيلة الحركة: تتحرك بواسطة الأسواط.

من أمثلتها: اليوجلينا.

٣ - شعبة الطحالب الذهبية

التركيب: معظمها وحيد الخلية ويطلق عليها الدياتومات والتي تتميز بأن:

- لها جدار شبه زجاجي يحتوي على مادة السيليكا.
- مصدراً مهماً لغذاء الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى.





شعبة الطحالب


٤ - شعبة الطحالب النارية

المعيشة: تعيش بالبحار والمحيطات حيث تشكل جزء كبير من الهائمات النباتية.
- تحتوي على صبغ أحمر يكتسبها لونا أحمر بجانب صبغ الكلورفيل.
من أمثلتها: الطحالب ثنائية الأسواط والتي تمثل أكبر مجموعة من شعبة الطحالب النارية وحتى تتحرك بواسطة سوطين.

ثالثاً : مملكة الفطريات

الخصائص العامة لمملكة الفطريات:

التركيب: بعضها وحيد الخلية، ومعظمها عديد الخلايا ويتكون من خيوط تعرف بالهيفات تتجمع معاً مكونة الغزل الفطري.
النواة: حقيقية.
الجدار الخلوي: يدخل في تركيبة البكتين.
الحركة: غير متحركة.



التغذية: غير ذاتية التغذية فبعضها متطفل وبعضها مترمم.
التكاثر: معظمها يتأثر جنسيا بالإضافة لتكاثرها لا جنسيا بالجراثيم.
تصنف مملكة الفطريات حسب تركيبها وطرق تكاثرها لخمس شعب من أهمها:

١- الفطريات التزاوجية:

- الخيوط الفطرية غير مقسمة والجراثيم تنتج داخل حوافظ:

مثال: فطر عفن الخبز الذي:

- يسبب العفن الأسود على الخبز.

- يستخرج منه إنزيم يستخدم في صناعة الجبن.

٢- الفطريات الرقيقة:

- بعضها وحيد الخلية والبعض الآخر عديد الخلايا ذو خيوط فطرية مقسمة بحواجز عرضية والجراثيم تتكون داخل أكياس جرثومية.

أمثلة:

- فطر الخميرة (وحيد الخلية).

- فطر البنسليوم (عديد الخلايا): الذي ينتج منه المضاد الحيوى المعروف بالبنسلين.

٣- الفطريات البازيدية: الخيوط الفطرية مقسمة والجراثيم تتكون داخل تركيب صولجاني الشكل (قبة).

مثال: فطر عيش الغراب الذي يستخدم بعض أنواعه كغذاء للإنسان.



فطر الخميرة



فطر البنسليوم



رابعاً : مملكة النبات


الخصائص العامة لمملكة النبات :

النواة : حقيقية .

الجدار الخلوي : يتكون من السليلوز .

التكاثر : يتكاثر معظمها جنسياً .

تصنف مملكة النبات إلى ثلاثة مجموعات كالتالي :



١ - مجموعة الطحالب الراقية

١- شعبة الطحالب الحمراء :

- أعشاب بحرية تتكون من خيوط متماسكة بغلاف هلامي .

- تحتوي خلاياها على حاملات أصباغ حمراء لذا تسمى بالطحالب الحمراء .

من أمثلتها : طحلب البولي سيفونيا .

٢- شعبة الطحالب البنية :

- أعشاب بحرية تتكون من خيوط بسيطة أو مرتفعة .

- تحتوي خلاياها على حاملات أصباغ بنية لذا تسمى بالطحالب البنية .

من أمثلتها : طحلب الفيوكس .

٣- شعبة الطحالب الخضراء :

- بعضها وحيد الخلية والبعض الآخر عديد الخلايا .

- تحتوي على بلاستيدات خضراء، لذا تسمى بالطحالب الخضراء .

من أمثلتها : طحلب الكلاميدوموناس (وحيد الخلية) : يحتوي على بلاستيدة فنجانية الشكل .

طحلب الإسبيروجيرا (عديد الخلايا) : يأخذ شكل خيوط غير متفرعة وتحتوي خلاياه على بلاستيدات حلزونية الشكل .



طحلب البولي سيفونيا



طحلب الفيوكس



طحلب الكلاميدوموناس



طحلب الإسبيروجيرا

٢ - مجموعة النباتات اللاوعائية



الريش



الفيوناريا

- نباتات لا تحتوي على أنسجة وعائية متخصصة في نقل الماء والغذاء لذا تسمى باللاوعائية.
- شعبة الحزازيات:**
- نباتات أرضية تعيش في الأراضي الرطبة والأماكن الظليلة لأنها تحتاج إلى الرطوبة بدرجة كبيرة للنمو والتكاثر.
- صغيرة الحجم خضراء اللون تحمل شعيرات للتثبيت (أشباه جذور).
- لا تحتوي على أنسجة وعائية متخصصة.
- تتكاثر لا جنسيا بالجراثيم.
- من أمثلتها:** - نبات الريشيا: المنبطح على سطح الأرض.
- نبات الفيوناريا: القائم على سطح الأرض.

٣ - مجموعة النباتات الوعائية

- نباتات تحتوي على أنسجة وعائية متخصصة للنقل وهي:
- الخشب الذي ينقل الماء والأملاح .
- اللحاء الذي ينقل المواد العضوية المتكونة خلال عملية البناء الضوئي (لذلك يطلق عليها النباتات الوعائية).
- شعبة الوعائيات:**

تصنف شعبة الوعائيات إلى ثلاث طوائف:

١- طائفة السرخسيات:



الفوجير

- نباتات بسيطة التركيب معظمها عشبية والقليل منها شجيرية أو أشجار لها سيقان وأوراق وجذور ويكثر وجودها على جدران الآبار والوديان الرطبة الظليلة.
- تحمل أوراق ريشية الشكل.
- لا تكون أزهاراً. - لا تكون بذوراً.
- تتكاثر لا جنسيا بالجراثيم التي توجد في تراكيب خاصة على السطح لأوراقها.
- أمثلة:** - نبات الفوجير.
- نبات كسبرة البئر.

٢- طائفة معراة البذور (المخروطيات):

- نباتات معظمها أشجار والقليل منها شجيرات وتحمل مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة.
- تحمل أوراق بسيطة إبرية الشكل.
- لا تكون أزهاراً (نباتات لا زهرية).
- تكون بذوراً ليس لها غلاف ثمري.
- مثال:** نبات الصنوبر.



الصنوبر

٣- طائفة مغطاة البذور (النباتات الزهرية):

- نباتات أرضية لها سيقان وأوراق وجذور.
- تحمل أوراق ذات تعرق متوازي أو شبكي.
- تكون أزهار تتحول إلى ثمار.
- تتكاثر جنسياً.
- تصنف إلى طويئفتين (تحت طائفة):
- ذوات الفلقة الواحدة.
- ذوات الفلقتين.

الفصل الدراسي الثاني

تصنيف طائفة مغطاة البذور إلى طويئفتين (تحت طائفة):

ذوات الفلقتين	ذوات الفلقة الواحدة	الصفات التصنيفية
ذات فلقتين.	ذات فلقة.	البذور
ذات تعرق شبكي.	ذات تعرق متوازي.	الأوراق
ذات محيطات زهرية رباعية أو خماسية ومضاعفاتها	ذات محيطات زهرية ثلاثية ومضاعفاتها.	الأزهار
حزم الأنسجة الوعائية مرتبة في حلقة بالساق.	حزم الأنسجة الوعائية مبعثرة بالساق.	الساق
وتدية.	ليفية.	الجذور
البسلة - الفول - القطن - الورد - البرتقال	القمح - الذرة - البصل - الصبار - الموز - النخيل - الزنبق	أمثلة


الفصل الدراسي الثاني



- التكاثر:** تتكاثر جنسا بالأمشاج، ولا جنسيا بالتبرعم والتجدد.
من أمثلتها: حيوان الإسفنج
- ليس لها جدر خلوية.
 - غير ذاتية التغذية.
 - متعددة الخلايا.
 - تضم القليل من الخلايا المتخصصة.

٢) شعبة اللاسعات

- المعيشة:** معظمها بحري يعيش في الماء فرادي أو في مستعمرات.
الفم: محاط بزوائد وامتدادات تسمى اللوامس.
الجسم: - لا يوجد به رأس.
 - ذات تماثل شعاعي ومزود بخلايا لاسعة.
 - خلاياه تنتظم في طبقتين نسيجتين الخارجيتين منها تحوي خلايا لاسعة يزداد عددها على اللوامس وذلك للدفاع عن النفس واصطياد الفرائس.
أمثلتها: (الهيدرا - قنديل البحر - شقائق النعمان).



شقائق النعمان



الهيدرا



قنديل البحر

٣) شعبة الديدان المفلطحة

- المعيشة:** معظمها يتطفل على كائنين ، والقليل منها حر المعيشة.
الجسم:



الديدان الشريطية


ديدان البلهارسيا

البلاتاريا

- به رأس مفلطح لذا تسمى بالديدان المفلطحة.
- مكون من ثلاث طبقات وذات تماثل جانبي.
- الجنس:** معظمها خنثى والقليل منها منفصل الجنس.
- مثل:** (ديدان البلاتاريا - ديدان البلهارسيا - الديدان الشريطية).


٤) شعبة الديدان الأسطوانية

- المعيشة:** بعضها يعيش حرا في الماء أو الطين وبعضها يتطفل على الإنسان والحيوان والنبات.
الجسم:



ديدان الأسكاريس

- أسطوانى مدبب الطرفين وغير مقسم لقطع.
- مكون من ثلاث طبقات وذات تماثل جانبي.
- به قناة هضمية ذات فتحتين (الفم، والشرج).
- يتراوح حجمه من المجهرى إلى ما يقرب طوله من المتر.
- الجنس:** وحيدة الجنس.
- من أمثلتها:** (ديدان الإسكاريس - ديدان الفلاريا).



ديدان الأرض

٥ (شعبة الديدان الحلقية)

المعيشة: معظمها يعيش حر في مياه البحار أو المياه العذبة أو التربة الطينية، والقليل منها يتطفل خارجياً.

الجسم: - مقسم إلى حلقات .

- به أشواك مدفونة في معظم الديدان لتساعد في الحركة.

الجنس: بعضها وحيد الجنس، والقليل منها خنثى.

من أمثلتها: - ديدان العلق الطبي.

- ديدان الأرض التي تعيش في أنفاق داخل التربة فتعمل على تهويتها وزيادة خصوبتها.

٦ (شعبة مفصليات الأرجل)

الجسم: مقسم إلى عقل تحمل عدة أزواج من الزوائد المقسمة إلى عدة مناطق يغطيها هيكل خارجي.

الجنس: بعضها وحيد الجنس والأجناس منفصلة.

تصنف شعبة مفصليات الأرجل إلى أربع طوائف هي:

أ- طائفة القشريات:

- الجسم يتكون من منطقتين الرأسصدر والبطن ويغطي بقشرة كيتينية.

- لها العديد من الزوائد المفصليّة التي تتحور بأشكال مختلفة لتؤدي وظائف متنوعة.

- ذات عيون مركبة. - تتنفس بالخياشيم.

من أمثلتها: (الجمبري - سرطان البحر (الكابوريا) - الإستاكوزا).

ب- طائفة العنكبوتيات:

- الجسم يتكون من منطقتين الرأسصدر والبطن.

- لها أربع أزواج من أرجل المشي. - ذات عيون بسيطة.

- تتنفس بالقصبيات الهوائية أو الرئات الكتبية.

من أمثلتها: (العنكب - العقارب).

ج- طائفة الحشرات:

- الجسم يتكون من ثلاث مناطق الرأس والصدر والبطن.

- لها ثلاثة أزواج من أرجل المشي، وزوجان من الأجنحة قد تغيب (كما في معظم أنواع النمل) أو يغيب زوج منها (كما في الذباب المنزلي).

- لها زوج من العيون المركبة وزوج من قرون الاستشعار.

- تتنفس بالقصبيات الهوائية.


من أمثلتها: (الذباب - الرعاش - البعوض - الصراصير - النمل - النحل - الفراشات - الجراد)



العنكبوت



النحلة



الجرادة

الفصل الدراسي الثاني



أرسل

د طائفة متعددة الأرجل:

- الجسم يتكون من منطقتين الرأس والجذع ومقسم إلى عدد من العقل.
- لها العديد من الأرجل.
- تتنفس بالقصبيات الهوائية.
- من أمثلتها: أم أربعة وأربعين أم ٤٤.

(٧) شعبة الرخويات

المعيشة: يعيش معظمها بالماء المالح وبعضها بالماء العذب، والقليل منها على الأرض.

الجسم:

- رخو مغطى بنسيج جلدي يسمى البرنس.
- يحتوي على أصداف كلسية قد تكون خارجية أو داخلية وقد تكون غائبة أو ضامرة غير مقسم لقطع وله جزء عضلي يستخدم للحركة يسمى القدم.
- به عضو يشبه اللسان (في معظم الرخويات) يحمل صفوف من الأسنان، ويسمى السفن ويستخدم في التغذية.
- الجنس: أغلبها وحيد الجنس والقليل منها خنث.
- من أمثلتها: (القواقع - المحار - الإخطبوط).

(٨) شعبة شوكيات الجلد

الجسم:

- قد يكون مستدير أو اسطواني أو نجمي الشكل وقد يكون للبعض منها أذرع.
- غير مقسم إلى قطع وله هيكل داخلي صلب.
- جداره به أشواك وصفائح كلسية (للعديد منها).
- به تركيبات شبيهة بالمصات تسمى الأقدام الأنبوية.
- الحركة: يتحرك بواسطة الأقدام الأنبوية أو الأشواك أو الأذرع.
- الأطراف:

- ليس لها طرف أمامي أو خلفي فمعظم شوكيات الجلد ذات جانبيين:
- الجانب الذي يقع فيه الفم يسمى السطح الفمي.
- الجنس: وحيدة الجنس.
- التكاثر: تتكاثر جنسيا بالأمشاج ولا جنسيا بالتجدد.
- من أمثلتها: نجم البحر - قنفذ البحر - خيار البحر.

(٩) شعبة الحبليات

- تضم أرقى حيوانات المملكة الحيوانية.
- تتميز أجنة الحبليات بوجود تركيب هيكلي بالجبهة الظهرية يسمى الحبل الظهرية قد يبقى طيلة حياة الحيوان أو يتحول لعمود فقري في معظم الحبليات.




الأخطبوط



القواقع الصراوى



نجم البحر



قنفذ البحر



خيار البحر

تصنف شعبة الحبليات لعدة شعبيات (تحت شعبة) وأهمها شعبيات الفقاريات:


شعبيات الفقاريات: - يظهر الحبل الظهري في الفقاريات في المرحلة الجنينية ويستبدل مع نمو الجنين بالعمود الفقري الذي يحيط ويحمي الحبل الشوكي.

- يوجد هيكل يتكون من العمود الفقري والجمجمة والأحزمة والأطراف.
- الدم يجري داخل الأوعية الدموية في دورة مغلقة ليغذي جميع أعضاء الجسم بالأكسجين والمواد الغذائية.

الحيوانات ذوات الدم الحار: هي حيوانات لا تتغير درجة حرارة أجسامها كثيرا مع تغير درجة حرارة البيئة، لذلك يطلق عليها الحيوانات داخلية الحرارة وتستخدم هذه الحيوانات طاقة الغذاء لتحافظ على درجة حرارة أجسامها ثابتة مثل الطيور والثدييات.

الحيوانات ذوات الدم البارد: هي حيوانات لا تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها، فهي تتغير تبعا للبيئة المحيطة بها، وتستمد حرارتها منها، وتسمى هذه المجموعة الحيوانات خارجية الحرارة مثل الأسماك والبرمائيات والزواحف.

تصنف الفقاريات لعدة طوائف منها:



أسماك اللامبري

(أ) طائفة الأسماك اللافكية: الهيكل الداخلي: غضروفي.

الجسم: رفيع يشبه ثعبان السمك ولا توجد به زعانف زوجية.

الفم: دائري يشبه القمع ومزود بلسان خشن وبأسنان عديدة وبدون فكوك.

التغذية: تتطفل وتلتصق عن طريق الفم بالأسماك الكبيرة حيث تثبت نفسها بالأسنان وتنهش لحم هذه الأسماك بلسانها الخشن الذي يشبه المبرد.

من أمثلتها: أسماك اللامبري.

(ب) طائفة الأسماك الغضروفية:

المعيشة: تعيش في المياه المالحة كالبهار.

الهيكل الداخلي: غضروفي.

الجسم: مغطى بقشور تشبه الأسنان.

الفم: بطني أي يقع في الناحية البطنية للرأس ومزود بفكين يحملان عدة صفوف من الأسنان تساعد في الإفتراس.

الزعانف: زوجية. **الفتحات الخيشومية:** غير مغطاه بغطاء خيشومي.

المثانات الهوائية: - لا توجد بها مثانة هوائية. - الأجناس منفصلة، والتلقيح داخلي.

من أمثلتها: (سمكة القرش - سمكة الراي).

(ج) طائفة الأسماك العظمية:

المعيشة: تعيش في المياه المالحة أو العذبة.

الهيكل الداخلي: عظمي.


الجسم: مغطى بقشور عظمية.

الفم: يقع بمقدمة الجسم. **الزعانف:** زوجية وفردية.


الفتحات الخيشومية: مغطاة بغطاء خيشومي.

المثانات الهوائية: توجد بها مثانة هوائية للمساعدة في العوم والطفو
الأجناس: منفصلة والتلقيح خارجي.

من أمثلتها: (سمكة البلطي - سمكة البوري).




سمكة الراي



سمكة البوري

الفصل الدراسي الثاني



(د) طائفة البرمائيات:

الجسم: مغطي بجلد رطب غدي.

الأطراف: لها أربع أطراف خماسية الأصابع.

التنفس: يتم بعدة طرق مختلفة، حسب أطوار نموها كالتالي.

الأطوار الجنينية: تتنفس بالخياشيم لأنها تعيش في الماء.

الأطوار اليافعة (البالغة):

- الأجناس منفصلة، والتلقيح خارجي.

- تتنفس الهواء الجوي بالرئتين والجلد لأنها تعيش على اليابسة.

- من ذوات الدم البارد.

من أمثلتها: (الضفدعة - السلمندر).

(هـ) طائفة الزواحف:

الجسم: - يتكون من أربع مناطق الرأس والعنق والجذع والذيل.

- مغطي بجلد جاف على حراشيف قرنية سميكة، بالإضافة إلى صفائح في بعض الأحيان.


الأطراف: لها أربع أطراف ضعيفة خماسية الأصابع بمخالب قرنية، وقد تنعدم الأطراف فتتحرك بالزحف.

التنفس: تتنفس الهواء الجوي بالرئتين.

- من ذوات الدم البارد.

- الإناث تضع بيضا ذات قشرة كلسية أو جلدية.

من أمثلتها: (التمساح - السلحفاة - البرص - السحلية - الحرباء - الثعبان).




(و) طائفة الطيور: الجسم: مغطي بالريش.

الأطراف: لها أربعة أطراف:

- الأمامية متحورة إلى أجنحة للطيران.

- الخلفية تنتهي بأربعة أصابع مزودة بمخالب قرنية تستخدم لـ:



التنفس: تتنفس بالرئتان وتحتوي أجسامها على أكياس هوائية تعتبر كمخازن لكميات إضافية من الهواء أثناء الطيران.

- الأجناس منفصلة، والتلقيح داخلي.

- من ذوات الدم الحار.

- الإناث تضع بيضا، وترقد عليه حتى يفقس.

ملائمة التركيب الداخلي للطيور لعملية الطيران:

- عظامها مجوفة خفيفة الوزن.
- عظمة القص عريضة لتثبيت العضلات الصدرية القوية التي تحرك الأجنحة أثناء الطيران.

من أمثلتها:

- (العصفورة - الحمام - الصقر - البط - الدجاج - النعام - النسر).
- (ن) طائفة الثدييات:

الجسم:

- يتكون من أربع مناطق الرأس والعنق والصدر والبطن.
- محاط بجلد مغطي بالشعر.

الأطراف: لها أربعة أطراف خماسية الأصابع.

التنفس: تتنفس الهواء الجوي بالرئتين.

الأسنان: متباينة (قواطع - أنياب - ضروس).

- الأجناس منفصلة، والتلقيح داخلي.

- الإناث معظمها ولود، ولها أثداء تفرز لبناً لإرضاع صغارها.

- تصنف طائفة الثدييات إلى ثلاث طويئفات (تحت طوائف)، هي:

١- طويئفة الثدييات الأولية:

- لا تلد وإما تضع البيض.

- ترضع صغارها لبناً يسيل من غدد ثديية على بطنها.

- لها فتحة مجمع لإخراج البول والبراز والبيض.

من أمثلتها: - خلد الماء (منقار البط).

- قنفذ النمل (أكل النمل الشوكي).

٢- طويئفة الثدييات الكيسية:

- تلد صغاراً غير مكتملة التكوين.

- ترضع الأم صغارها من أثداء داخل كيس خاص أسفل بطنها تحفظ فيه الصغار حتي يكتمل نموها.

من أمثلتها: الكنغر (الكانجرو).

٣- طويئفة الثدييات الحقيقية (المشيمية):

- تلد صغاراً مكتملة النمو.

- تشمل الثدييات الحقيقية العديد من الحيوانات، يأتي على رأسها الإنسان.

تصنف طويئفة الثدييات الحقيقية إلى عدة رتب، منها:

١- عديمة الأسنان:

- لها مخالب قوية ملتوية.

- بعضها عديم الأسنان والبعض الآخر فقد أسنانه الأمامية فقط.

من أمثلتها: (المدرع - الكسلان).



الفصل الدراسي الثاني

٢. آكلة الحشرات:

تتغذى على الحشرات، وتمتد أسنانها الأمامية في الفكين على شكل ملقاط للقبض على الفريسة.

من أمثلتها: القنفذ.

٣. آكلة اللحوم:

- لها مخالب قوية حادة ملتوية.

- لها أنياب طويلة مدببة، والضروس الأمامية حادة والخلفية عريضة طاحنة.

من أمثلتها:

(الأسد - النمر - الذئب - الثعلب - الكلب - القط - سبع البحر).

٤. الحيوانات الحافرية فردية الأصابع:

- حيوانات آكلة للعشب.

- لها عدد فردي (واحد أو ثلاثة) من الأصابع، لكل منها حافز قرني، وأسنانها كبيرة الحجم متكيفة لطحن الطعام.

من أمثلتها: (الخيول - الحمير - الحمار الوحشي - الخرتيت).

٥. الحيوانات الحافرية زوجية الأصابع:

- حيوانات آكلة للعشب.

- لها عدد زوجي من الأصابع ويغلف كل أصبع منها حافر قرني.

من أمثلتها: (الأغنام - الماعز - الزرافة - الغزلان - الإبل).

٦. العوتيات:

- حيوانات مائية ضخمة تعيش في البحار والمحيطات.

- الطرفان الأماميان متحوران إلى مجاديف للعوام وتلاشت الأطراف الخلفية.

- تتنفس الهواء الجوي بالرئتين.

- الإناث تلد وترضع صغارها.

من أمثلتها: (الحوت - الدولفين).

٧. القوارض:

- لها زوج من القواطع في كل من الفك العلوي والفك السفلي.

- القواطع حادة تشبه الأزميل.

- الذيل طويل والأذن صغيرة.

من أمثلتها: (الفأر - اليربوع - الجرذان - السنجاب).

٨. الأرنبات:


- الذيل قصير والأذن طويلة.

- لها زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد في الفك السفلي.

من أمثلتها: الأرنب.



القنفذ



٩. الخفاشيات:

- تنشط أساسا أثناء الليل.

- أطرافها الأمامية متحورة الأجنحة، حيث استطالت أصابع اليد من الثاني للخامس، وامتد الجلد من الجسم إلى ما بين هذه الأصابع.

من أمثلتها: الخفاش.

١٠. الحيوانات الخرطومية:

- لها خرطوم عضلي طويل.

- تنمو السنن العلويتان لتكونا ما يعرف بناي الفيل.


من أمثلتها: الأفيال.

١١. الرئيسيات:

- أرقى الثدييات، لها زوجان من الأطراف خماسية الأصابع، والإبهام بعيد عن باقي الأصابع.

- المخ كبير والجهاز العصبي متطور في الأنواع الراقية.

من أمثلتها: (القرد - الليمور - الغوريلا - الشمبانزي - النسناس - الإنسان).



(١) التقنيات الحديثة في تصنيف الكائنات الحية:

- ١- اعتمد العلماء الأوائل في تصنيف الكائنات الحية على المقارنات الشكلية لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات المختلفة.
- ٢- اتجه العلماء إلى تصنيف الكائنات الحية (منذ مئات السنين) على أساس تحديد درجات الصلة والقربا في بينها (العلاقات التطورية) من خلال:
 - الأبحاث في مجال على التشرح المقارن على أساس تحديد التشابهات التشرحية .
 - التشابهات في التراكيب الطبيعية كالغدد.
 - التراكيب الهيكلية .
 - دراسة التطور الجيني .

٣- في هذه الأيام ومع تطور تقنيات الفحص المجهرى بإختراع الميكروسكوب الإلكتروني وتطور تقنيات التحليل البيوكيميائي ظهرت أسس جديدة لتحديد درجات الصلة والقربا بين الكائنات، منها:
الأبحاث العلمية الخاصة بالحمض النووي DNA الموجود بالنواة من خلال التقنية المعروفة بتتابعات حمض DNA، ثم يتم من خلالها تحديد ترتيب وتتابع النيوكليوتيدات في الشريط المزدوج لحمض DNA وقد توصل العلماء إلى أنه كلما زاد التشابه في ترتيب النيوكليوتيدات بشريط DNA كانت الكائنات أكثر صلة وقربا.

(٢) اكتشافات حديثة في علم الأحياء: توصل الباحثون إلى استخدام خلاصة

الإسفنجات واللاسعات (خاصة قناديل البحر) حديثاً في الصناعات الكيميائية والدوائية حيث تم:

- ١- التوصل إلى استخدامات طبية محتملة للسموم المسببة للشلل والتي يستخدمها بعض قناديل البحر لإقتناص فرائسها.
- ٢- اكتشاف مركبات جديدة واعدة كمضادات حيوية ومضادات للسرطان في بعض أنواع الإسفنجيات.

- على الرغم من أن هذا النوع من التقنية الحيوية ما زال حديثاً إلا أنه مثير للغاية ،فمن المحتمل أن ينتج عن هذه الأبحاث تطوير أدوية جديدة.



قناديل بحر

الأنشطة العملية على الباب الرابع (التصنيف)

عملي نشاط (١): أشكال البكتيريا وخصائصها



المواد والأدوات المستخدمة:

- شرائح لأنواع البكتيريا الثلاثة (كروية - عصوية - حلزونية).
- ميكروسكوب ضوئي مركب به عدسة زيتية.

الخطوات:

- ١- أفحص الشرائح المرقمة (٣:١) لأنواع البكتيريا الثلاثة بواسطة العدسة الزيتية للميكروسكوب.
- ١- ارسم شكلاً تخطيطياً لكل نوع من أنواع البكتيريا وصنفها حسب شكلها.

الملاحظة:

الشريحة (٣)	الشريحة (٢)	الشريحة (١)	أوجه الاختلاف
			
نوع البكتيريا: حلزونية	نوع البكتيريا: عصوية	نوع البكتيريا: كروية	
جميعها وحيدة الخلية ولا توجد بها أنوية واضحة.			أوجه التشابه

الأساس المستخدم في تصنيف الأنواع الثلاثة من البكتيريا: شكل البكتيريا.

الإستنتاج: صُنِفَ البكتيريا في مملكة مستقلة (مملكة البدائيات) لأنها تتميز بالخصائص الآتية:

- ١- كائنات وحيدة الخلية
- ٢- لها جدار خلوي.
- ٣- المادة الوراثية غير محاطة بغشاء نووي.

نشاط عملي (٢): فحص الطلائعيات في عينة من ماء بركة:

المواد والأدوات المستخدمة:

- ماء بركة.
- شرائح زجاجية.
- أغشية شرائح.
- مجهر ضوئي مركب.
- ساق زجاجية.
- قطارة.

الخطوات:

- ١- ضع قطرة من ماء البركة على شريحة زجاجية ثم غطها بغطاء زجاجي.

- ٢- أفحص الشريحة بالقوة الصغرى للميكروسكوب.

- ٣- ارسم الكائنات التي تشاهدها

- ٤- صف الكائنات المختلفة التي لاحظتها بماء البركة مع ذكر وسيلة حركتها.


الملاحظة:

الأميبا: يخرج من الجسم امتدادات مؤقتة تعرف بالأقدام الكاذبة وهي وسيلة حركتها.

البراميسيوم: يحيط بالجسم أهداب يتحرك بواسطتها.

اليوجلينا: كائن وحيد الخلية يحتوي على بلاستيدات خضراء ويقوم بعملية البناء الضوئي ويتحرك بالأسواط.

الاستنتاج: يحتوي ماء البركة على العديد من الطلائعيات التي تتنوع في وسيلة وطريقة الحركة.



نشاط عملي (٣) : فحص السرخسيات : المواد والأدوات المستخدمة :

(نبات سرخسي - عدسة يدوية - ماء - قطارة بلاستيكية).

الخطوات:

- ١- أفحص السطح العلوي والسفلي لورقة النبات السرخسي باستخدام العدسة اليدوية.
 - ٢- ارسم ورقة النبات السرخسي موضحاً التراكيب الموجودة على سطحها السفلي.
- الرسم والاستنتاج: الخصائص التركيبية لورقة النبات السرخسي:
- الورقة ذات شكل ريشي.

- سطح الورقة أملس وناعم ولايحتوي على بثرات وسطحها السفلي خشن لإحتوائه على الكثير من البثرات المملثة بالجراثيم.

نشاط عملي (٤) : فحص ديدان الأرض :

المواد والأدوات المستخدمة :

- ديدان أرض موضوعة في وعاء يحوى تربة رطبة.

- أوراق جرائد. - ملقط. - عدسة مكبرة. - مساطر بلاستيكية.

الملاحظة	الخطوات
١- جسم الدودة مقسم إلى حلقات وله جلد رقيق ورطب به شويكات من جهة البطن ويبلغ طوله عند السكون ١٢ سم تقريباً.	١- ضع الديدان فوق ورق الجرائد وصف الشكل الخارجى لها ثم قس طولها بالمسطرة.
٢- تتحرك الدودة بانقباض وانبساط حلقات الجسم.	٢- دع الديدان تتحرك وصف حركتها.
٣- تتمسك الدودة بإحكام بسطح الأرض عند التحرك بمساعدة شويكات البطن.	٣- راقب جسم الديدان عند التحرك و اشرح كيف تسمح تراكيبها الخارجية بالحركة.
٤- نسمع صوتاً نتيجة احتكاك شويكات البطن مع سطح الورقة.	٤- اسمع الصوت الصادر عن حركة الديدان فوق الجرائد.
٥- نشعر بخشونة لوجود الشويكات كما نتبين عدم احتوائها على فقرات داخلية (أى أنها حيوان لا فقارى).	٥- امسك إحدى الديدان و مرر أصابعك على السطح البطنى من الخلف إلى الأمام ثم حاول أن تتبين احتوائها على فقرات عظمية داخلية.

المُرشد في الأحياء اث

نشاط رقم (٥) : فحص نبات زهرى:

المواد والأدوات المستخدمة:

(نبات فول مزهر - نبات زنبق مزهر - عدسة يدوية).

الخطوات:

١- أفحص أجزاء النبات باستخدام العدسة اليدوية.

٢- لاحظ الأجزاء التي يتكون منها النبات الزهرى.

٣- ارسم النبات وأكتب أسماء الأجزاء على الرسم.

الملاحظة	الجزور	الأوراق	عدد المحيطات الزهرية
نبات الفول	وتدية	ذات تعرق شبكى	رباعية أو خماسية ومضاعفاتهما
نبات الزنبق	ليقية	ذات تعرق متوازي	ثلاثية ومضاعفاتهما

- لا تشترك النباتات الزهرية في الأجزاء نفسها لإختلاف نبات الفلقة الواحدة (الزنبق) عن نباتات الفلقتين (الفول) في شكل الجذور والأوراق والمحيطات الزهرية.

الاستنتاج: النباتات الزهرية لها سيقان وأوراق وجذور وهى تكون أزهار تتحول إلى ثمار تحوى البذور داخلها.

نشاط عملى (٦) : مقارنة بين الزواحف والبرمائيات:

المواد والأدوات المستخدمة:

عينات محفوظة من السحالى والضفادع.

الخطوات	الملاحظة والاستنتاج
لاحظ كل من السحلية والضفدعة دون لمسها ثم: ١- صف أهم التراكيب الشكلية لكل منها.	صفات جسم الضفدعة: يتكون من رأس وجذع وبه زوجان من الأطراف خماسية الأصابع ويوجد بين أصابع الطرفين الخلفيين غشاء أملس ورطب وينتشر عليه حبيبات كثيرة مختلفة الحجم.
٢- حدد الفرق الأكثر وضوحاً في التراكيب الشكلية لكل منهما والفروق الأخرى التي لاحظتها.	صفات جسم السحلية: يتكون من رأس وجذع وذيل به زوجان من الأطراف الضعيفة القصيرة خماسية الأصابع ذات مخالب والجلد جاف مغطى بحراشيف قرنية.
٣- وضح كيف يبدو الجلد بكل منهما.	الفرق الأكثر وضوحاً هو تركيب الجسم: الضفدعة ليس لديها ذيل كالسحلية والأطراف الخلفية للضفدعة أكثر طولاً للقفز. الفروق الأخرى: ملمس وتركيب الجلد.
	جلد الضفدعة: رطب أملس.
	جلد السحلية: جاف مغطى بحراشيف قرنية.

المراجعة العامة على الباب الرابع

س ١: الأسئلة العامة:

- ١- اذكر عمل كل من: (ارسطو - كارل لينوس - روبرت فيتكر).
- ٢- ما المقصود بكل من: (التسلسل التصنيفي - المفتاح التصنيفي الثنائي - التصنيف - النوع - التسمية الثنائية).
- ٣- قارن بين كل من: (البدايات والطلائعيات - البكتريا القديمة والبكتريا الحقيقية)
- ٤- اذكر أهمية كل من:
- ٥- (فطر عيش الغراب - الدياتومات - الأسواط في اليوجلينا - فطر البنسليوم - ديدان الأرض - الخياشيم) اذكر الصفات العامة للفطريات ؟
- ٦- ما الفرق بين كل من: (ذوات الفلقة وذوات الفلقتين - الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية - الحشرات والعنكبوتيات).
- ٧- اكتب عن كل من: (اللاسعات - الحزازيات - الرخويات).
- ٨- ما هي مسببات الأمراض التالية: (مرض النوم - الملاريا - داء الفيل).
- ٩- اذكر أهمية كل من: (ديدان الأرض - السفن أو المففات - المثانة الهوائية).
- ١٠- اكتب عن: (الأسماك اللافكية - البرمائيات).
- ١١- قارن بين: (الثدييات الأولية والثدييات الكيسية والثدييات المشيمية)
- ١٢- اكتب الوضع التصنيفي لكل من: (الخرتيت - الخفاش - سبع البحر - المدرع - النعام - سمكة الراي - خيار البحر - البلاناريا - الفوجير - التريبانوسوما).
- ١٣- اكتب نبذة مختصرة عن (اذكر خصائص كلاً من): (١) مملكة الحيوان. (٢) شعبة الإسفنجيات.

س ٢: اذكر السبب العلمي (علل):

- ١- التايجون لا يطلق عليه مصطلح نوع.
- ٢- اليوجلينا كائن حي يحمل مزيجاً من الصفات النباتية والحيوانية.
- ٣- تسمى الحزازيات بالنباتات اللاوعائية والسرخسيات بالنباتات الوعائية.
- ٤- تسمى النباتات الزهرية بمغطاة البذور.
- ٥- يصنف نبات الفول ضمن النباتات ذوات الفلقتين.
- ٦- ينتمي السلمندر إلى البرمائيات، بينما ينتمي التمساح إلى الزواحف.
- ٧- عظمة القص عريضة في الطيور.
- ٨- البرمائيات والزواحف من ذوات الدم البارد.
- ٩- الطيور والثدييات من ذوات الدم الحار.
- ١٠- يصنف حيوان الكانجارو ضمن الثدييات الكيسية.
- ١١- يعتبر الحوت من الثدييات على الرغم من أنه يعيش في الماء.
- ١٢- الرئيسيات هي أرقى الثدييات جميعاً.
- ١٣- تتنفس الأطوار الجنينية للبرمائيات بالخياشيم، بينما تتنفس الأطوار اليافعة بالرئتين والجلد.
- ١٤- لحيوان اللامبري فم دائري مزود بلسان خشن وأسنان عديدة وبدون فكوك.

- ١٥- ينتمي النوستوك إلى أوليات النواة، الأميبا إلى حقيقيات النواة.
- ١٦- وجود مثناة هوائية في الأسماك العظمية.
- ١٧- الهيدرا وقنديل البحر من اللاسعات.
- ١٨- يحتوي جسم الكثير من الديدان الحلقية على أشواك مدفونة بالجلد.
- ١٩- الجمبري من الحيوانات مفصلية الأرجل.
- ٢٠- ينتمي العقرب للعنكبيات وليس للحشرات.
- ٢١- ينتمي الصنوبر لمعراة البذور، بينما القطن لمغطاة البذور.

س٣: أكتب المفهوم العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- مجموعة من الأفراد لها صفات مورفولوجية متشابهة وتتزاوج فيما بينها.
- ٢- سلسلة من الخصائص مرتبة في أزواج تقود المستخدم لتعريف كائن حي غير معلوم.
- ٣- نوع من البكتريا، لها القدرة على المعيشة في البيئات ذات الظروف القاسية.
- ٤- كائنات حقيقية النواة غير معقدة التركيب البعض منها له جدران خلوية وبلاستيدات.
- ٥- كائنات حقيقية النواة وحيدة الخلية وعديدة الخلايا، تتكون من خيوط بالهيفات.
- ٦- نوع من الفطريات تنتج الجراثيم داخل أكياس صولجانية الشكل.
- ٧- نباتات بسيطة التركيب معظمها عشبية والقليل منها شجيرية وأشجار.
- ٨- نباتات لا زهرية معظمها أشجار والقليل منها شجيرات.
- ٩- حيوانات مائية جسمها بسيط التركيب غير متحرك ومدعم بهيكل من الشوكيات.
- ١٠- طحلب عديد الخلايا تحتوي خلاياه على بلاستيدات حلزونية الشكل.
- ١١- حيوانات ذات جسم مجوف وهو يفتح للخارج بفتحة كبيرة علوية تسمى الفوية.
- ١٢- حيوانات تمتد أسنانها الأمامية في الفكين على شكل ملقاط للقبض على الفريسة.
- ١٣- حيوانات ذات جسم مفلطح وبه رأس ومكون من ثلاث طبقات وذات تماثل جانبي.
- ١٤- ديدان بجسم الكثير منها أشواك مدفونة بالجلد لتساعده في الحركة.
- ١٥- حيوانات ليس لها أذرع أجسامها مغطاه بأشواك للحماية والتحرك.
- ١٦- حيوانات ذات خمس أذرع أو أكثر تمتد في نظام شعاعي من قرص مركزي.
- ١٧- أسماك لها فم دائري يشبه القمع ومزود بأسنان عديدة وبدون فكوك.
- ١٨- أعلى مستوي تصنيفي في التسلسل الهرمي لتصنيف الكائنات الحية.
- ١٩- مجموعة من الثدييات لا تلد، ولكنها تضع بيضا وترقد عليه.
- ٢٠- زوائد وامتدادات تحيط بفم الاسعات.
- ٢١- حيوانات تتنفس بالخياشيم ثم بالرئتين والجلد.

س٤: أعد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما تحته خط:

- ١- وضع العالم فيكتر نظام التصنيف التقليدي.
- ٢- صنف العالم كارل لينوس الكائنات الحية إلى ثلاث ممالك.
- ٣- تصنف شعبة الأوليات الحيوانية إلى أربع طوائف حسب نوع التغذية.
- ٤- الفيوكس من الطحالب الذهبية التي تتميز بجدار شبه زجاجي يحتوي على السيليكا.
- ٥- يتكاثر فطر البنسليوم لا جنسيا بالتبرعم.
- ٦- عفن الخبز من شعبة الفطريات الزقية.

الفصل الدراسي الثاني

- ٧- طحلب البوليسفونيا من الطحالب وحيدة الخلية.
- ٨- قمتاز شعبة الحزازيات بوجود نسيج موصل لنقل الماء والغذاء.
- ٩- الفوجير من طائفة معراة البذور.
- ١٠- النخيل له جذور وتديه وأوراق شبكية التعرق.
- ١١- تتحرك شعبة الرخويات بواسطة الأقدام الأنبوبية أو الأشواك أو الأذرع.
- ١٢- اليوجلينا من أمثلة البكتيريا الحقيقية ذاتية التغذية.
- ١٣- هناك سبع مستويات لتصنيف الكائنات الحية، تبدأ بالشعبة، وتنتهي بالطائفة.
- ١٤- تعيش الديدان الشريطية في كبد الإنسان.
- ١٥- ديدان البلاناريا تسبب اضطرابات معوية وأنيميا وضعف وهزال.
- ١٦- الإسبروجيرا من أمثلة البكتيريا الخضراء المزرققة.
- ١٧- الأسماك العظمية لها جسم غضروفي يشبه ثعبان السمك ولا توجد به زعانف زوجية.
- ١٨- سرطان البحر يتنفس بالقصبيات الهوائية أو الرئات الكتابية.
- ١٩- للعقارب زوج من العيون المركبة وزوج من العيون الإستشعار.
- ٢٠- يتكون جسم الجمري من رأس وجذع ومقسم إلى عدد من العقل.
- ٢١- تحتوي شعبة الرخويات على أصداف كيتينية.
- ٢٢- يغطي الجسم من القشريات بقشرة كلسية.

س: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

- ١- لا يطلق على التايجون مصطلح النوع لأنه:
 - ٢- (لا يشبه أبائه - ليس له القدره على التزاوج - ينتج أفراد خصبة - جميع ما سبق)
 - ٣- يتركب جسم البدائيات من: (خلية واحدة - خليتين - خلايا متعددة - لا شئ مما سبق)
 - ٤- تتكاثرجنسياً ولا جنسياً. (البدائيات - الأوليات الحيوانية - الطحالب الذهبية - الطلائعيات)
 - ٥- من أمثلة الأوليات التي تتحرك بالأهداب: (الأميبا - البراميسيوم - البلازموديوم - التريپانوسوما)
 - ٦- يصنف البلازموديوم ضمن طائفة: (السوطيات - الهدديات - الجرثوميات - الأميبات)
 - ٧- من الطلائعيات التي يمكنها القيام بعملية البناء الضوئي:
 - ٨- (اليوجلينا - البراميسيوم - البلازموديوم - التريپانوسوما)
 - ٩- من النباتات اللاوعائية التي تنتمي إلى شعبة الحزازيات: (الفوكس - الفول - الفوجير - الفيوناريا)
 - ١٠- يغطي جسم الزواحف بـ (ريش - شعر كثيف - حراشيف قرنية - قشور عظمية)
 - ١١- من النباتات التي تحتوى على مخاريط: (الذرة - البسلة - الصنوبر - القمح)
 - ١٢- تتميز النباتات ذات الفلقة الواحدة بـ:
 - ١٣- (جذور ليفية - تعرق الأوراق متوازي - محيطات زهرية ثلاثية - جميع ما سبق)
 - ١٤- من اللاسعات: (الهيدرا - قنديل البحر - شقائق النعمان - جميع ما سبق)
 - ١٥- المفصليات التي تحمل ثلاث أزواج من الأرجل تتبع طائفة:
 - ١٦- (القشريات - الحشرات - العنكبوتات - عديد الأرجل)
 - ١٧- الجسم يتكون من منطقتين الرأسصدر والبطن ويغطي بقشرة كيتينية في:
 - ١٨- (الكابوريا - العقرب - الجراد - العنكبوت)
 - ١٩- ينتمي الإخطبوط إلى شعبة: (شوكيات الجلد - الرخويات - اللاسعات - الإسفنجيات)

- ١٥- من مميزات رتبة الرئيسيات:
(أرقي الثدييات - أطرافها خماسية الأصابع - الجهاز العصبي متطور - جميع ما سبق)
- ١٦- من أمثلة شوحيات الجلد: (قنفذ البحر - قنديل البحر - القواقع - الجمبري)
- ١٧- الجلد رطب غدي في: (الزواحف - مفصليات الأرجل - البرمائيات - الطيور)
- ١٨- قد تنعدم الأطراف في: (الزواحف - الطيور - البرمائيات - الثدييات)
- ١٩- من الحيوانات ذات الدم الحار: (الأسماك - البرمائيات - الثدييات - الزواحف)
- ٢٠- عظام.....خفيفة الوزن ومجوفة. (البرمائيات - الزواحف - الطيور - الثدييات)
- ٢١- الحيوانات التالية من ذوات الدم البارد ما عدا: (النعام - الضفدعة - السحلية - الحرباء)
- ٢٢- من الحيوانات التي تتنفس أطواها اليافعة بالجلد والرئتين: (السحلية - السلمندر - الثعبان - التمساح)

امتحانات

الفصل

الدراسي

الثاني

سلسلة المرشد تصدر من (دار الكتب الأزهرية) بالفجالة

امتحان تجريبي (١) للصف الأول الثانوي

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

١- أدنى مستوى تصنيفي للكائنات الحية هو:

(المملكة - الشعبة - الطائفة - النوع)

٢- التركيب الصبغي لحالة تيرنر:

(XO+٤٤ - XXY+٤٤ - XX+٤٤)

٣- تصنف اليوجلينا ضمن مملكة:

(البدياتيات - الطلائعيات - النبات - الحيوان)

٤- نسبة الجيل الثاني في حالة الجينات المتكاملة:

(١:٣:٣:٩ - ١:٣:٧:٩ - ١:٢:١)

(ب) قارن بين كل من:

١- فصيلة الدم (A) وفصيلة الدم (B).

٢- العنكبويات والحشرات.

س٢: (أ) أكتب المفهوم العلمي المناسب لكل مما يلي:

١- ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف.

٢- جينات إذا وجدت بصورة متماثلة تعطل النمو وتوقف الحياة لربع النسل.

٣- حالة وراثية تظهر في الجيل الأول صفة وسطية بين صفتي الأبوين.

٤- شعبة من الكائنات الحية تصنف على أنها حيوانات رغم أنها لا تتحرك.

(ب) ما نتيجة: تزاوج رجل يميز الألوان من سيده عادية هجين لتمايز الألوان وذلك على أسس وراثية.

س٣: (أ) ماذا يحدث في الحالات الآتية:

١- ترك قطعة خبز مبللة في مكان دافئ عدة أيام.

٢- تهجين فئران صفراء معاً (على أسس وراثية).

٣- إخصاب بويضة $X+٢٢$ بحيوان منوي $X+٢٣$.

٤- تلوث الحشرات بلون البيئة التي تعيش منها.

(ب) أكتب نبذة مختصرة عن:

١- الحزازيات.

٢- الصفات المحددة بالجنس.

٣- Rh^+ .

س٤: (أ) أفحص الكائنات الموضحة ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

١- تعرف على كل كائن من هذه الكائنات وحدد الشعبة التي ينتمي إليها.

٢- حدد وسيلة الحركة في كل كائن من هذه الكائنات.

(ب) أكتب الوضع التصنيفي لكل من:

- الحرباء.

- الصنوبر.

- الرعاش.

- الدياتومات.

- كسبرة البئر.

الفصل الدراسي الثاني

امتحان تجريبي (٢) للصف الأول الثانوي

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية:

- ١- نسبة الجيل الثاني في حالة الجينات المميتة ١:٣:٣:٩.
- ٢- تنتمي دورة الأرض إلى شعبة الديدان الأسطوانية.
- ٣- الجنس عبارة عن مجموعة من الأفراد لها صفات مورفولوجية متشابهة وتتزاوج فيما بينها.
- ٤- من أمثلة الصفات المتأثرة بالجنس حالة الهيموفيليا.

(ب) الشكل المقابل يوضح التحليل الوراثي لأحد الحالات الكروموسومية الشاذة في الإنسان:

- ١- هل حدث الخطأ في الكروموسومات الجسدية أم الجنسية.
- ٢- أكتب اسم الحالة الشاذة التي يمثلها الشكل وأذكر أعراضها.

س٢: (أ) اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:

- ١- تنتمي الخميرة إلى مملكة:

(النبات - الحيوان - الفطريات - البدائيات)

٢- التركيب الصبغي لحالة كلاينفتر:

(XX+٤٤ - XXY+٤٤ - XO+٤٤ - XXX+٤٤)

٣- تعد وراثة إفراز الحليب في الماشية مثال للصفات:

(المرتبطة بالجنس - المتأثرة بالجنس - المحددة بالجنس - المنزلية)

٤- إذا كان عدد صبغيات بويضة الدروسوفيل هو ٤ صبغيات فإن خلايا الجسم تحتوي على (٤ - ٨ - ١٢ - ١٦) صبغي/ات.

(ب) أذكر اسم الكائن المسبب للأمراض التالية:

- ١- مرض النوم.
- ٢- مرض الملاريا.
- ٣- التهاب المثانة البولية.
- ٤- داء الفيل.

س٣: (أ) علل:

- ١- تحمل اليوجلينا مزيجاً من الصفات النباتية والحيوانية.
- ٢- لا يورث الأب الصفة المرتبطة بالجنس لأبنائه الذكور.
- ٣- قد يعيش الحمل الثاني لأم سابلة ريسويس متزوجة من رجل موجب لهذا العامل.
- ٤- جلد الضفدعة دائماً رطباً.

(ب) إذا علمت أن: عدد الكروموسومات في خلية ذراع إنسان ٤٦ كروموسوم. أوجد عدد الكروموسومات في:

- ١- البويضة.
- ٢- الخلية العصبية.
- ٣- الحيوان المنوي.

س٤: (أ) أكتب المفهوم العلمي:

- ١- أعلى مستوى تصنيفي في التسلسل الهرمي لتصنيف الكائنات الحية.
- ٢- حالة وراثية يتحكم زوج من الجينات لا يسود أي منهما على الآخر بل يشتركا في اظهار صفة جديدة.
- ٣- كائنات لا تتغير درجة حرارتها مهما تغيرت درجة حرارة الوسط.
- ٤- سلسلة من المولدات اكتشفت في دم القرود والإنسان معاً.

(ب) قارن بين كل من:

- ١- السيادة التامة وانعدام السيادة.
- ٢- ذوات الفلقة وذوات الفلقتين.

امتحان تجريبي (٣) للمصف الأول الثانوي

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) أكتب المفهوم العلمي:

- ١- حالة وراثية تسبب سيولة في الدم.
- ٢- ديدان تعيش في أنفاق داخل التربة فتعمل على تهويتها وزيادة خصوبتها.
- ٣- ترتيب الكروموسومات تنازلياً حسب حجمها ثم ترقيمها.
- ٤- أسماك لها فم دائري يشبه القمع ومزوداً بأسنان عديدة وبدون فكوك.

(ب) فسر على أسس وراثية:

تهجين نبات شب الليل يحمل أزهاراً حمراء مع نبات آخر يحمل أزهاراً قرنفلية وذلك على أسس وراثية.

س٢: (أ) علل:

- ١- الذكر هو المسئول عن تحديد جنس الجنين وليس الأنثى.
- ٢- عظمة القص عريضة في الطيور.
- ٣- تعتبر وراثية فصائل الدم مثلاً للسيادة التامة وانعدام السيادة وتعدد البدائل.
- ٤- البرمائيات من ذوات الدم البارد أما الثدييات من ذوات الدم الحار.

(ب) قارن بين:

- أ- الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس.
- ب- ذكر كلاينفلتر وذكر داوون.
- ج- الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية.

س٣: (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

١- إذا كان التركيب الجيني لأحد الأبناء هو aa فإن التركيب الجيني للأبوين هو:

(aa×AA - aa×Aa - AA×AA - Aa×AA)

٢- زوجان كلاهما هجين في صفة العتة الطفولي فإن احتمال انجابهم لأطفال مصابين بالعتة يكون بنسبة%.

(٢٥ - ٥٠ - ٧٥ - ١٠٠)

٣- ينتمي النوستوك إلى عالم:

(النباتات - البدائيات - الطلائعيات - الفطريات)

٤- من النباتات اللازهرية:

(الفوجير - البصل - القمح - الفول)

(ب) إذا علمت أن: جين العيون المتسعة سائد على جين العيون الضيقة، فما هي احتمالات ظهور صفة العيون

من تزاوج رجل من امرأة كل منهما متسع العينين هجين وضع ذلك على أسس وراثية.

الفصل الدراسي الثاني

س٤: (أ) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

- ١- يحمل زوج الكروموسومات الجنسية في الإنسان رقم (٢١).
- ٢- يغطي الجسم في القشريات بقشرة كلية.
- ٣- تعتبر وراثه صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة من أمثلة الجينات المتكاملة.
- ٤- تتحرك الرخويات بواسطة الأقدام الأنبوبية أو الأذرع.

(ب) أكتب عن:

- ١- الرثات الكتابية.
- ٢- البرنس.
- ٣- الأقدام الكاذبة.
- ٤- المثانة الهوائية.
- ٥- كيس الكانجارو.

امتحان (القاهرة) للصف الأول الثانوي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٧/٢٠١٨م
 الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

أجب عن الأسئلة الآتية:

س١: (أ) تخير الاجابة الصحيحة مما بين الأقواس فيما يلي:

١- من الثدييات التي تطير:

(النعام - العصفير - الخفافيش - الصقور)

٢- يتبع فطر البنسليوم شعبة:

(الفطريات الزقية - الفطريات الكيسية - الفطريات التزاوجية - الفطريات البازيدية)

٣- التركيب الكروموسومي لحالة تيرنر هو ٤٤+:

($xo - xxy - xx - xy$)

٤- عند تلقيح نباتين من بسلة الزهور طرزهما الجينية AABb ، تكون نسبة الأزهار البيضاء في الجيل الناتج %

(صفر - ٢٥ - ٥٠ - ٧٥)

(ب) عند تلقيح ذكر وأنثى من حشرة الدروسوفيلا كحانت أفراد الجيل الناتج تحتوي على ذكور حمراء العيون، ذكور بيضاء العيون، إناث حمراء العيون، وإناث بيضاء العيون، بنسبة ١ : ١ : ١ : ١ .

١- ما الطرز الجينية والطرز الظاهرية للأباء؟ - ما الطرز الجينية للأبناء؟

س٢: (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي:

١- حيوانات لها رأس وأجسامها مفلطحة ومكونة من ثلاث طبقات وذات تماثل جانبي.

٢- حيوانات تمتد أسنانها الأمامية في الفكين على شكل ملقاط للقبض على الفريسة.

٣- فصيلة دم تحتوي على أجسام مضادة anti-a ومولدات الالتصاق B.

٤- خلايا تحتوي على نسختين متطابقتين من الكروموسومات تورث إحداها من الأم والثانية من الأب.

(ب) صنف الكائنات الحية التالية:

٣- الخميرة.

٢- الريشيا.

١- الفيل.

س٣: (أ) أعد كتابة الجمل التالية بعد تصحيح ما تحته خط:

١- يتحرك البراميسيوم بواسطة الأقدام الكاذبة بينما يتحرك التريبانوسوما بواسطة الأسواط.

٢- يتنفس سرطان البحر بواسطة القصصيا الهوائية أو الكتب الرئوية.

٣- الطرز الجيني (B^+B) يمثل الصلع المبكر في الإناث.

٤- يتحكم في عامل الريسوس (Rh) أربعة أزواج من الجينات.

(ب) علل لما يأتي:

١- لا يورث الأب المصاب بالهيموفيليا المرض لابنه الذكر.

٢- تسمية طائفة معراة البذور بهذا الاسم.

٣- وجود أكياس هوائية في الطيور.

الفصل الدراسي الثاني

س ٤: (أ) ما المقصود بكل مما يأتي:

- ١- نظام التسمية الثنائية.
- ٢- طائفة الجرثوميات.
- ٣- الجينات المميتة.
- ٤- مولدات الالتصاق في فصائل الدم.

(ب) قارن بين كل مما يأتي:

- ١- الفأر والأرنب.
- ٢- الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس.

امتحان (أسيوط) للصف الأول الثانوي ١٤٢٩هـ / ٢٠١٧/٢٠١٨م

الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

س ١: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١- الفصيلة التي تحمل كلا نوعين مولدات الالتصاق هي الفصيلة:

(O - AB - B - A)

٢- تعد وراثة إفراز الحليب في الماشية مثال للصفات:

(المرتبطة بالجنس - المتأثرة بالجنس - المحددة للجنس - المندلية)

٣- من الحيوانات ذات الدم الحار:

(الأسماك - البرمائيات - الثدييات - الزواحف)

٤- من أمثلة الديدان الحلقية:

(الديدان الكبدية - الاسكارس - البلهارسيا - العلق الطبي)

(ب) ماذا يحدث مع التفسير:

١- تهجين فئران صفراء معاً.

٢- تخصيب بويضة (x+٢٣) مع حيوان منوي (x+٢٢).

٣- ترك قطعة خبز مبللة في مكان دافئ عدة أيام.

س ٢: (أ) صوب ما تحته الخط:

١- نسبة ظهور الصفات في الجيل الثاني لانعدام السيادة هي ٣ : ١.

٢- يرجع التحكم في وراثة عامل ريسس إلى خمسة أزواج من الجينات يحملها زوج واحد من الكروموسومات.

٣- طفيل البلازموديوم يسبب مرض النوم.

٤- يصنف نبات الريشيا باعتباره من ضمن شعبة الوعائيات.

(ب) علل لما يأتي:

١- يصنف نبات الفول ضمن النباتات ذات الفلقتين.

٢- على الرغم من قدرة الخفاش على الطيران إلا أنه يصنف ضمن الثدييات وليس الطيور.

٣- يتميز جنس جنين الإنسان الذكر قبل الأنثى.

س ٣: (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي:

١- حيوانات تتميز باحتواء الفك العلوي على زوج من القواطع الحادة وذات ذيل طويل.

٢- جميع الجينات الموجودة على الكروموسومات بكل خلية جسمية بجسم الإنسان.

٣- صفة وراثية تظهر على الرجال حيث يتأثر جين هذه الصفة بالهرمونات الذكرية.

٤- حيوانات مائية جسمها مزود بخلايا لاسعة.

(ب) قارن بين كل من:

٢- فصيلة A وفصيلة B.

١- الحشرات والعناكب.

س٤: (أ) ما المقصود بكل من:

٢- التقسيم الوراثي لفصائل الدم.

١- الطرز الكروموسومي.

٤- طويئفة الثدييات الكيسية.

٣- أوليات النواة.

(ب) ١- بالتجليل الوراثي بين: توارث صفة عمى الألوان لأب مصاب بمرض عمى الألوان مع أم سليمة.

٢- وضح بالرسم فقط: تركيب البوجلينا مع كتابة البيانات.

امتحان (البحيرة) للصف الأول الثانوي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٧/٢٠١٨م

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) أكمل ما يأتي:

١- تسمى أزواج الكروموسومات المتماثلة في الإنسان من رقم ١ - ٢٢ بالكروموسومات

٢- في حالة الجينات يمكن الحصول على الصفة السائدة من أبوين يحمل كل منهما الصفة المتنحية.

٣- يختلف الكروموسوم (X) عن الكروموسوم (Y) في

٤- مملكة البدائيات يخلو جدارها الخلوي من

٥- وظيفة الخلايا اللاسعة في شعبة اللاسعات و.....

(ب) اكتب نبذة عن:

٢- شعبة الطحالب الذهبية.

١- أهمية فصائل الدم.

س٢: (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي:

١- حالة وراثية يتداخل فيها فعل الجينات وتختلف صفات الأبناء عن الآباء في الجيل الأول ثم تظهر صفات الآباء والأبناء في الجيل الثاني بنسبة ١ : ٢ : ١.

٢- جينات تسبب تعطيل النمو وتوقف الحياة في مراحل مختلفة من العمر حينما توجد بصورة متماثلة.

٣- سلسلة من الأوصاف مرتبة في أزواج تقود المستخدم لتعريف كائن حي غير معلوم بالنسبة له.

٤- حيوانات من ذوات الدم الحار، عظامها مجوفة خفيفة الوزن وعظمة القص عريضة وأجسامها تحتوي على أكياس هوائية.

٥- حيوانات آكلة العشب لها عدد زوجي من الأصابع ويغلف كل أصبع فيها حافر قرني.

(ب) قارن بين: النباتات ذوات الفلقة الواحدة والنباتات ذوات الفلقتين.

س٣: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

١- تحدث حالة كلاينفلتر نتيجة إخصاب بويضة (22+xx - 22+x - 22+0) بحيوان منوي 22+Y.

٢- قدرة إناث الطيور على وضع البيض من الصفات بالجنس.

(المرتبطة - المتأثرة - المحددة)

٣- طائفة الجرثومات:

(تتحرك بواسطة الأسواط - تتحرك بواسطة الأهداب - ليس لها وسيلة حركة)

٤- ينتمي طحلب الفيوكس إلى شعبة الطحالب:

(الحمراء - البنية - الخضراء)

٥- من أمثلة الديدان الاسطوانية:

(قنديل البحر - ديدان الفلاريا - الديدان الشريطية)

٦- تتنفس متعددة الأرجل بـ:

(الريئات الكتبية - الخياشيم - القصبيات الهوائية)

(ب) ماذا يحدث إذا:

١- تزوج رجل (Rh^+) من امرأة (Rh^-) وكان الجنين داخل الرحم (Rh^+).

٢- لم تحفظ الثدييات الكيسية صغارها داخل كيس خاص أسفل البطن.

س٤: (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

١- الطفل المغولي يحمل في خلايا جسمه ثلاث نسخ من الكروموسوم رقم ٢١ وقد يكون ذكر أو أنثى

()

()

()

()

()

()

()

٢- تقع جينات الصفات المتأثرة بالجنس على الكروموسومات الجنسية

٣- عيش الغراب يستخرج منه إنزيم يستخدم صناعة الجبن

٤- يوجد في معظم الرخويات عضو يشبه اللسان يسمى السفن ويستخدم في التغذية

٥- شعبة الجلد شوكيات وحيدة الجنس وتتكاثر جنسيا بالأمشاج ولا جنسيا بالتجدد

٦- يوجد بداخل الأسماك الغضروفية مثنائات هوائية ولها غطاء خيشومي

(ب) علل لما يأتي:

١- الذكر لا يورث صفة عمى الألوان لأبنائه الذكور.

٢- لا يطلق مصطلح النوع على كل من التايجون والبغل.

امتحان (الدقهلية) للصف الأول الثانوي ١٤٣٩هـ ٢٠١٧/٢٠١٨م

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) صحح ما فوق الخط:

١- العالم روبرت هوك أول من اكتشف الجينات المرتبطة بالجنس.

٢- الإسبروجيرا من أمثلة البكتريا الخضراء المزرققة.

٣- يتحكم في وراثة مولدات عامل الريسوس زوج واحد من الجينات يحملها زوج واحد من الكروموسومات.

٤- تحتوي شعبة الرخويات علي أصداف كيتينية.

(ب) قارن بين: ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين من حيث الأوراق والجذور.

(ج) تعتبر فصائل الدم تعدد بدائل وسيادة تامة. وضح ذلك.

س٢: (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

١- نوع من الفطريات تنتج الجراثيم داخل تركيب صولجاني الشكل.

٢- حالة شاذة في الإنسان تنشأ نتيجة نقص في الكروموسومات الجنسية.

٣- مواد توجد علي سطح خلايا الدم الحمراء تشارك في تحديد نوع الفصيلة وتتحكم في عمليات نقل الدم.

٤- حيوانات تمتد أسنانها الأمامية في الفكين علي شكل ملقاط للقبض علي الفريسة.

(ب) علل:

- ١- عظمة القص عريضة في الطيور.
- ٢- اليوجلينا كائن حي يحمل مزيجاً من الصفات النباتية والحيوانية.
- ٣- تصنف الإسفنجيات كحيوانات رغم أنها غير متحركة.

س٣: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

- ١- تعد قدرة إناث الطيور علي وضع البيض مثال للصفة: (مرتبطة بالجنس - متأثرة بالجنس - محددة الجنس)
- ٢- تعتبر الطحالب النارية إحدى شعب مملكة: (البدائيات - الطلائعيات - النبات)
- ٣- من أمثلة الديدان المفلطة: (الإسكارس - الفلاريا - البلاناريا)
- ٤- وراثية صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة تتبع: (انعدام السيادة - جينات مميتة - جينات متكاملة)

(ب) ما هو ناتج تزواج رجل مصاب بعمى الألوان من أنثى سليمة (نقية) في الجيل الأول، فسر إجابتك علي أسس وراثية.

س٤: (أ) أكمل العبارات الآتية:

- ١- قنفذ النمل من طويثفة
- ٢- حالة وراثية تسبب سيولة في الدم.
- ٣- الصلع الوراثي مثال لصفات
- ٤- تتميز شعبة شوحيات الجلد بوجود تركيبات شبيهة بالممصات تسمى

(ب) وضع بالرسم كامل البيانات: (الأميبا - فطر عفن الخبز).

(ج) اذكر أهمية الفحوص الطبية قبل الزواج.

امتحان (المنوفية) للصف الأول الثانوي ١٤٣٩هـ - ٢٠١٧/٢٠١٨م

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١- لون عيون حشرة الدرسوفيل من الصفات:

- ٢- الصنوبر من نباتات طائفة: (المتأثرة بالجنس - المميتة - المرتبطة بالجنس)
- ٣- من الديدان الخيطية مدببة الطرفين بعضها حر والآخر متطفل: (السرخسيات - الحزازيات - معراة البذور)
- ٤- ذكر عقيم وتظهر عليه بعض الصفات الأنثوية من أعراض حالة: (أم ٤٤ - البلهارسيا - الفلاريا)

(ترنر - كلاينفلتر - داون)

الفصل الدراسي الثاني

(ب) ما يحدث إذا:

- ١- إغفال تحديد عامل ريسس قبل نقل الدم والزواج.
- ٢- عظام الطيور غير مجوفة.

س٢: (أ) صوب ما تحته الخطأ:

- ١- عند إجراء تلقيح ذاتي لنبات شب الليل أزهاره قرنفلية يكون نسبة ظهور صفة الأبوين ٢٥%.
- ٢- السلمندر يتنفس الهواء الجوي بواسطة الفتحات التنفسية.
- ٣- من الأعشاب البحرية التي تحمل أصباغ بنية مثل الفيوناريا.
- ٤- تعد وراثة الحليب في الماشية مثالا لصفات المتأثرة بالجنس.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- لا يورث الذكر صفته المرتبطة بالجنس لأبنائه الذكور.
- ٢- وجود مثانة هوائية في الأسماك العظمية.

س٣: (أ) اذكر المصطلح العلمي لما يأتي:

- ١- جينات تشترك فيما بينها لإظهار الصفة الوراثية وتتحكم في توريث الصفة زوجان من الجينات.
- ٢- كائنات تتحرك بواسطة الأسواط وتتطفل على الإنسان.
- ٣- تستخدم في دراسات تصنيف السلالات البشرية ودراسة التطور.
- ٤- ثدييات لا تلد وتضع بيض وترقد عليه والأم ترضع الصغار من غدد على البطن.

(ب) قارن بين طائفة القشريات وطائفة العنكبليات من حيث: (الحركة - التنفس) مع ذكر مثال.

س٤: (أ) ما المقصود بكل من:

- ١- الجينات المميتة.
- ٢- الهيموفيليا.

(ب) وضع بالرسم مع ذكر الشعبة لكل من: الهيدرا - الريشيا.

امتحان (الغربية) للصف الأول الثانوي ١٤٢٩هـ - ٢٠١٧/٢٠١٨م

الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

س١: (أ) اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية:

- ١- مادة مولدة توجد على سطح خلايا الدم الحمراء قد تسبب الإجهاض للمرأة الحامل.
- ٢- نباتات ذات جذور وتدنية وأوراقها شبكية التعرق.
- ٣- حالة وراثية يمكن الحصول منها على الصفة السائدة من أبوين يحملان الصفة المتنحية.
- ٤- عضو في معظم الرخويات يشبه اللسان يحمل عدة صفوف من الأسنان ويستخدم في التغذية.

(ب) اذكر أهمية كل من:

- ١- فطر البنسليوم.
- ٢- فصائل الدم.

(ج) تزوج رجل فصيلة دمه (B) من امرأة فصيلة دمها (A) فأنجبا نسلًا به فصائل الدم الأربعة.

فسر ذلك على أسس وراثية.

س ٢: (أ) تقبّر الاجابة الصحيحة من بين القوسين:

- ١- عند تزاوج رجل سليم من العمى اللوني من امرأة مصابة بهذا المرض فإن ظهور هذه الحالة تكون في:
(كل الذكور - كل الإناث - نصف الذكور - نصف الإناث)
- ٢- وراثّة صفة القرون في بعض أنواع الماشية من الصفات:
(المحددة بالجنس - المرتبطة بالجنس - المتأثرة بالجنس - غير محددة بالجنس)
- ٣- أدنى مستوى تصنيفي للكائنات الحية هو:
(المملكة - الشعبة - الطائفة - النوع)
- ٤- يعتبر الجمبري من طائفة:
(الحشرات - عديدات الأرجل - العنكبيات - القشريات)

(ب) قارن بين: الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية.

(ج) وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات: قطر عفن الخبز.

س ٣: (أ) اذكر مثالا واحدا لكل من:

- ١- صفة محددة بالجنس.
- ٢- حزازيات قائمة.
- ٣- ثدييات أولية.
- ٤- شعبة الطحالب البنية.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- يعاني مصاب حالة كلاينفلتر من العقم.
- ٢- ينتشر الصلع الوراثي بين رجال بعض العائلات أكثر من النساء.
- ٣- يصنف الخفاش من الثدييات بالرغم من قدرته على الطيران.

س ٤: (أ) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خطأ:

- ١- لون الأزهار في نبات شب الليل من أمثلة حالة الجينات المتكاملة.
- ٢- زوج الكروموسومات الجسدية الشاذة في حالة داون هو الزوج التاسع عشر.
- ٣- عدد أزواج القواطع في الفك العلوي للسنجاب زوجين.
- ٤- يعتبر القنفذ من الثدييات الكيسية.

(ب) صنف الكائنات الآتية: ١- نبات الفول. ٢- الأميبا.

(ج) أنجب زوجان لا تظهر عليهما أعراض الهيموفيليا أبناءاً مرضى بالهيموفيليا.
فسر ذلك على أسس وراثية.

الفصل الدراسي الثاني

امتحان (القليوبية) للصف الأول الثانوي ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧/٢٠١٨ م
الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

١- (أ) أكمل ما يأتي:

- ١- تحتوي الخلايا الجسدية على من الكروموسومات المتماثلة.
- ٢- تهمل صفة لون الأزهار في نبات بسلة الزهور حالة
- ٣- من الحيوانات التي تلد صغاراً غير مكتملة التكوين
- ٤- شعبة اللاسعات لا يوجد لها والجسم يحتوي على تجويف يسمى التجويف الوعائي المعدي.

(ب) ١- وضع بالرسم كامل البيانات تركيب فطر عفن الخبز.

٢- استخرج الشاذ فيما يلي:

- (أ) [الهيموفيليا - عمى الألوان - لون العين في الدروسوفيليا - الصلع].
- (ب) [نجم البحر - خيار البحر - قنديل البحر - قنفذ البحر].

٢- (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

- ١- حالة مرضية تنشأ نتيجة وجود صبغي زائد في الكروموسومات رقم (٢١).
- ٢- مجموعة من الأفراد لها صفات مورفولوجية متشابهة وتتزاوج فيما بينها وتنتج أفراد تشبهها وتكون خصبة.
- ٣- حيوانات يتكون الجسم فيها من أربع مناطق (رأس وعنق وجذع وذيل) رباعية الأطراف وأطرافها ضعيفة خضاسة الأصابع وتتحرك بالزحف.
- ٤- فصيلة دم تخلو من الأجسام المضادة وتسمى مستقبل عام.

(ب) ١- انب الكائنات الآتية إلى الطائفة التي تنتمي إليها:

- (أ) البراميسيوم.
- (ب) كسبرة البئر.
- (ج) اللامبري.
- (د) أم ٤٤.

٢- تزوج رجل فصيلة دمه (AB) من امرأة فصيلة دمها (O). ما هي فصائل الدم المتوقع ظهورها على الأبناء، بوضعاً ذلك على أسس بالزحف.

٢- (أ) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خطأ:

- ١- عند تكوين الأمشاج يعود العدد الزوجي للكروموسومات من جديد.
 - ٢- نسبة الجيل الثاني في حالة الجينات المتكاملة هو ٩ : ٣ : ٣ : ١.
 - ٣- من أمثلة شعبة الديدان المفلطة: الفلاريا.
 - ٤- يغطي الجسم في الجمبري وسرطان البحر بقشور عظيمة.
- (ب) قارن بين: رتبة القوارض، والأرنبيات من حيث: (عدد القواطع - الذيل - الأذن).

المُرشد في الأحياء اث

س٤: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

١- يتألف الجين من تتابع من:

(الجليكوجين - الكروموسومات - النيوكليوتيدات)

٢- يتحكم في وراثة مولدات عامل الريسوس (زوجين - ثلاثة أزواج - خمسة أزواج) من الجينات.

٣- تعد صفة إفراز الحليب في الماشية مثالاً لصفات:

(مرتبطة بالجنس - متأثرة بالجنس - محددة بالجنس)

٤- أزهار نباتات ذوات الفلقتين ذات محيطات:

(ثنائية - ثلاثية - رباعية أو خماسية ومضاعفتها - أحادية)

(ب) علل لما يأتي:

١- الحيوانات المنوية هي التي تحدد الجنس.

٢- فصائل الدم تعتبر مثالاً للسيادة التامة وانعدام السيادة.

٣- تمثل صفة عمى الألوان بجين واحد في الذكور.

امتحان (كفر الشيخ) للصف الأول الثانوي ١٤٢٩هـ - ٢٠١٧/٢٠١٨م

الزمن: ساعتان

الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

س١: (أ) اكتب المصطلح العلمي:

١- كل الجينات التي توجد داخل كل خلية جسمية بشرية.

٢- حالة وراثية يمكن الحصول فيها على الصفة السائدة من أبوين يحمل كل منهما صفة متنحية.

٣- ترتيب الكروموزومات تنازلياً حسب حجمها وترقيمها.

٤- نباتات لا زهرية تحمل أوراق إبرية الشكل ومخاريط مذكورة ومؤنثة.

٥- حالة وراثية تركيبها الصبغي $X0+44$ ولا تصل إلى مرحلة البلوغ.

(ب) قارن بين طويئفة ذات الفلقة الواحدة وطويئفة ذوات الفلقتين من حيث:

(تعرق الأوراق - الأنسجة الوعائية بالساق)

س٢: (أ) تزوج رجل أصلع من امرأة لا تعاني من تساقط الشعر وكلاهما هجين. فما الطرز المظهرية والجينية

للأبناء؟

(ب) صوب ما تحته خط فيما يأتي:

١- الإسبروجيرا من أمثلة البكتريا الخضراء المزرققة.

٢- تحتوي شعبة الرخويات على أصداف كيتينية.

٣- نبات الريشيا من الحزازيات القائمة، بينما الفوجير من معراة البذور.

س٣: علل لما يأتي:

١- لا يعتبر التيجون نوعاً.

٢- الرئيسيات أرقى الثدييات جميعها.

٣- ينتمي العقرب للعنكبيات وليس للحشرات.

٤- تمثل صفة عمى الألوان بجين واحد فقط في الذكور.

١- البراميسيوم.
٢- الجمبري.
٣- سمكة القرش.
٤- صنف كل مما يأتي إلى شعبة وطائفة:

(ب) ماذا يحدث إذا تم إنبات بادران نبات الذرة في مكان مظلم؟

امتحان (الدقلمية) للصف الأول الثانوي ١٤٣٨هـ ٢٠١٦/٢٠١٧م

الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

أجب عن الأسئلة الآتية:

١- (أ) أكمل العبارات التالية:

- ١- التركيب الصبغي لأنثى مصابة بحالة داون هو
- ٢- يختلف الطرز الكروموسومي لذكر الإنسان عن الأنثى في زوج الكروموسوم رقم
- ٣- أم ٤٤ تتبع طائفة بينما اللامبري يتبع طائفة
- ٤- يعتمد تقسيم فصائل الدم إلى أربعة فصائل على نوعين من المواد التي توجد في الدم هما و

(ب) أذكر أهمية كل من:

- ١- الدياتومات.
- ٢- الجينيوم البشري.
- ٣- الكيس الموجود أسفل بطن الكانجارو.

٢- (أ) صوب ما تحته خط:

- ١- من أمثلة الصفات المتأثرة بالجنس حالة الهيموفيليا.
 - ٢- نبات الريشيا من الحزازيات القائمة.
 - ٣- البويضات هي التي تحدد جنس الجنين في الإنسان.
 - ٤- تصنف شعبة الحيوانات الأولية إلى أربعة طوائف حسب نوع التغذية.
- (ب) تم تلقيح نباتات بسلة الزهور بيضاء الأزهار فنتجت أفراد الجيل الأول كلها قرمزية الأزهار. فسر ذلك على أسس وراثية.

٣- (أ) أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية:

- ١- الاسم الأول في التسمية الثنائية لكل كائن ويبدأ بحرف كبير.
- ٢- نباتات ذات جذور ليفية وأوراق ذات تعرق متوازي.
- ٣- ترتيب الكروموسومات تنازلياً حسب حجمها ثم ترقيمها.
- ٤- صفات تقتصر ظهورها على أحد الجنسين دون الجنس الآخر نتيجة الاختلافات في الهرمونات الجنسية لدى كل جنس.

(ب) علل لما يأتي:

- ١- لا يطلق على التايجون مصطلح النوع.
- ٢- لا تتفق وراثية لون أزهار النبات في شب الليل مع قوانين مندل.

س٤: (أ) أختَر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس:

١- تنتمى الأميبا إلى طائفة:

(اللحميات - الهدديات - السوطيات)

٢- فصيلة الدم التى لا تحتوى على أجسام مضادة هى:

(O - AB - A)

٣- التلقيح يكون خارجياً في:

(الزواحف - الأسماك العظمية - الطيور)

٤- تبلغ نسبة الأفراد سالبى عامل الريسوس من أفراد الجنس البشرى حوالى%:

(١٥ - ٢٥ - ٨٥)

(ب) ١- أكتب نبذة مختصرة عن: شعبة اللاسعات.

٢- ما عضو التنفس في كل من: الجمبرى - النحل.

امتحان (الدقهلية) للصف الأول الثانوي ١٤٣٦هـ / ٢٠١٤/٢٠١٥م

الفصل الدراسي الثاني الأحياء الزمن: ساعتان

أولاً: السؤال الأول إجبارى:

س١: (أ) أختَر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:

١- فصيلة الدم التى لا تحتوى على أجسام مضادة هى:

(A - O - B - AB)

٢- تشتمل على مجموعة من الطوائف.

(الفصيلة - الرتبة - الشعبة - الطائفة)

٣- إذا كان عدد الكروموسومات في خلية جلد الإنسان ٢٣ زوجاً فإن الكروموسومات في الحيوان المنوى:

(٢٣ زوجاً - ٢٣ - ٤٦ زوجاً - ٤٦)

٤- وراثية صفة غياب الكلوروفيل في نبات الذرة تتبع حالة:

(الجينات المتكاملة - الجينات المهيمنة - انعدام سيادة - ارتباط تام)

٥- جميع ما يلى من الكائنات تسبب أمراض للإنسان ماعدا:

(الديدان المفلطحة - الجرثوميات - الدياتومات - السوطيات)

(ب) عند تهجين نبات بازلاء قرمزي الأزهار مع نبات بازلاء أبيض الأزهار كان الناتج ٣ أبيض: ١ قرمزي.

وضح ذلك على الأسس وراثية.

(ب) صنف الكائنات التالية (من حيث: المملكة والشعبة):

(البرامسيوم - نبات الفول - البلهارسيا).

ثانياً: أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي:

س٢: (أ) علل:

- ١- تسمى النباتات الزهرية مغطاة البذور.
- ٢- يحتوي جسم الكثير من الديدان الحلقية على أشواك مدفونة بالجلد.
- ٣- حالة كلاينفلتر تصيب الذكور فقط بينما حالة تيرنر تصيب الإناث فقط.
- ٤- يختلف الطرز الكروموسومي لذكر الإنسان عن الطرز الكروموسومي للأنثى.

(ب) فسر على أسس وراثية:

تزاوج رجل فصيلة دمه (A) من امرأة فصيلة دمها (B) فأنجبا طفلاً فصيلة دمه (O).

س٣: (أ) أكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية:

- ١- نباتات أرضية تعيش في الأراضي الرطبة بعضها قائم وبعضها الآخر منبطح.
- ٢- نوع من مولدات الالتصاق توجد على سطح خلايا الدم الحمراء وقد تسبب الإجهاض للمرأة الحامل.
- ٣- مجموعة من الثدييات لا تلد ولكنها تضع بيضاً وترقد عليه والأم ترضع الصغار اللبن.
- ٤- زوج من الكروموسومات لا تخضع لترتيب الكروموسومات من حيث الحجم ولكنه يرتب في نهاية الكروموسومات.

(ب) اكتب عن:

١- وسائل الحركة في الأوليات الحيوانية.

٢- الفطريات الزقية.

س٤: (أ) قارن بين: الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية من حيث: "الفم - المثانة - الأجناس".

(ب) أكمل ما يأتي:

١- وراثي عمى الألوان في الإنسان مثلاً لحالة صفات بالجنس.

٢- ينتمي الأخطبوط إلى شعبة

٣- من أمثلة إنعدام السيادة لون أزهار نبات

٤- تعتبر شعبة الطحالب النارية إحدى شعب مملكة